

非抗生素类抗感染药：抗结核、麻风分支杆菌类药5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/226/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c23_226781.htm 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】乙胺丁醇属于抗结核、麻风分支杆菌类栏目，主要讲述了药物名称 乙胺丁醇 药物别名 英文名称 Ethambutol 说明片剂：每片0.25g。功用作用 对结核杆菌和其他分支杆菌有较强的抑制作用。口服吸收约80%，血药浓度达峰时间2~4小时，蛋白结合约40%，在体内仅有10%左右的药物代谢成为非活性物，主要经肾排泄。与其他抗结核药间无交叉耐药性。。本文重点关注丁醇 药物 结核 耐药性 等内容，您可以在本页对乙胺丁醇进行讨论【关键字】抗结核、麻风分支杆菌类.丁醇.药物.结核.耐药性.乙胺丁醇【全文】

药物名称 乙胺丁醇 药物别名 英文名称 Ethambutol 说明片剂：每片0.25g。功用作用 对结核杆菌和其他分支杆菌有较强的抑制作用。口服吸收约80%，血药浓度达峰时间2~4小时，蛋白结合约40%，在体内仅有10%左右的药物代谢成为非活性物，主要经肾排泄。与其他抗结核药间无交叉耐药性。但结核杆菌对本品也可缓慢产生耐药性。为二线抗结核药，可用于经其他抗结核药治疗无效的病例，常与其他抗结核药联合应用。以增强疗效并延缓细菌耐药性的产生。用法用量 口服：1次0.25g，1日0.5~0.75g。也可开始时1日服25mg/kg，分2~3次给予；服药至第8周后减量为1日15mg/kg，分为2次。在长期联合用药方案中，本品可1周2次，每次用50mg/kg。注意事项（1）主要副作用是球后视神经炎，其发生与剂量大小有关（按正常用法，发生率为0.8%），长期服药易于

引起。表现为视敏度降低、辨色力受损、视野缩窄、出现暗点等，停药后可缓慢恢复，也有不能恢复者。用药期间应检查视觉。（2）胃肠道反应，如恶心、呕吐、腹泻等。（3）偶见过敏反应、肝功能损害、下肢麻木、关节炎、粒细胞减少、高尿酸血症、精神症状（幻觉、不安、失眠）等。（4）乙醇中毒者、乳幼儿禁用。糖尿病患者必须在控制糖尿病的基础上方可使用本品。已发生糖尿病性眼底病变者慎用本品，以防眼底病变加重。肾功能不良者减量慎用。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com