

非抗生素类抗感染药：抗结核、麻风分支杆菌类药1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/226/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c23_226783.htm 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】利福定属于抗结核、麻风分支杆菌类栏目，主要讲述了药物名称 利福定 药物别名 异丁哌利福霉素 英文名称 Rifandin 说明 胶囊：每胶囊150mg、75mg。功用作用 抗菌谱与利福平相似，对结核杆菌、麻风杆菌有良好的抗菌活性，其用量为利福平的1 / 3时，可获得近似或较高的疗效。对金黄色葡萄球菌有良好作用，对部分大肠杆菌也有一定抗菌活性。...。本文重点关注药物 胶囊 作用 抗菌 等内容，您可以在本页对利福定进行讨论【关键字】抗结核、麻风分支杆菌类.药物.胶囊.作用.抗菌.利福定【全文】药物名称 利福定 药物别名 异丁哌利福霉素 英文名称 Rifandin 说明 胶囊：每胶囊150mg、75mg。功用作用 抗菌谱与利福平相似，对结核杆菌、麻风杆菌有良好的抗菌活性，其用量为利福平的1 / 3时，可获得近似或较高的疗效。对金黄色葡萄球菌有良好作用，对部分大肠杆菌也有一定抗菌活性。此外，对沙眼病毒也有抑制作用。口服吸收良好，2~4小时血药浓度达峰。体内分布广，以肝脏和胆汁中为最高，其余依次为肾、肺、心、脾，在脑组织中含量甚微。主要用于肺结核和其他结核病、麻风病、化脓性皮肤病、结膜炎、沙眼等。用法用量 成人每日150~200mg，早晨空腹一次服用。儿童按3~4mg / kg，一次服用。治疗肺结核病的疗程为1 / 2~1年。眼部感染采取局部用药（滴眼剂浓度0.05%）。注意事项（1）与利福平显示交叉耐药性，故本品不适于利福平治疗无效的病例。

(2) 对消化道有刺激，可引起恶心、呕吐、腹泻等副作用。

(3) 用药期间，应定期作血、尿常规和肝、肾功能检查，肝、肾功能不良者应慎用。

(4) 孕妇慎用。

(5) 曾有报道称可引起男子乳房女性化。

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com