

非抗生素类抗感染药：抗病毒类-金刚烷胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/226/2021\\_2022\\_\\_E9\\_9D\\_9E\\_E6\\_8A\\_97\\_E7\\_94\\_9F\\_E7\\_c23\\_226791.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/226/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c23_226791.htm) 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】金刚烷胺属于抗病毒类栏目，主要讲述了药物名称 金刚烷胺 药物别名 金刚胺，三环癸胺

，SYMMETREL 英文名称 Amantadine 说明片剂：每片100mg。复方金刚烷胺片：每片含金刚烷胺0.15g，扑尔敏3mg，用于防治流感。起效快，用药后48小时作用明显，2周后达高峰， $t_{1/2}$ 10~28小时，药物以原形由肾排出，酸性尿排泄加速。本文重点关注金刚烷胺 药物 用于 流感 等内容，您可以在本页对金刚烷胺进行讨论【关键字】抗病毒类.金刚烷胺.药物.用于.流感.金刚烷胺【全文】药物名称 金刚烷胺 药物别名 金刚胺，三环癸胺，SYMMETREL 英文名称 Amantadine 说明片剂：每片100mg。胶囊剂：每胶囊100mg。糖浆剂：100mg/ml。复方金刚烷胺片：每片含金刚烷胺0.1g，氨基比林0.15g，扑尔敏3mg，用于防治流感。每日早晚各1片，小儿酌减。可连用3~5日，至多10日。功用作用（1）进入脑组织后可促进释放多巴胺，或延缓多巴胺的代谢而发挥抗震颤麻痹作用。对震颤麻痹有明显疗效，缓解震颤、僵直效果好。起效快，用药后48小时作用明显，2周后达高峰， $t_{1/2}$ 10~28小时，药物以原形由肾排出，酸性尿排泄加速。（2）抗亚洲A-型流感病毒作用。对该型流感接触者保护率约70%。（3）退热作用，对多种炎症、败血症、病毒性肺炎等与抗生素合用退热作用比单用抗生素好。【应用】用于不能耐受左旋多巴治疗的震颤麻痹患者；用于亚洲A-型流感、病

毒性感染发热患者。用法用量 口服：成人每次0.1g，早晚各1次，最大剂量每日400mg。小儿用量酌减，可连用3~5日，最多10日。1~9岁小儿每日3mg/kg，最大用量不超过150mg/日。注意事项（1）不良反应少，少数病人服后可有嗜睡、眩晕、抑郁、食欲减退等，亦可出现四肢皮肤青斑，踝部水肿等。（2）震颤麻痹患者超过200mg/d时，疗效不增，毒性渐增。老年患者耐受性低，可出现幻觉谵妄。（3）精神病、脑动脉硬化、癫痫、哺乳妇女慎用。可致畸胎，孕妇禁用。肾功能不良者酌减剂量。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)