

非抗生素类抗感染药：抗病毒类-膦甲酸钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/226/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c23_226794.htm 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】膦甲酸钠属于抗病毒类栏目，主要讲述了药物名称 膦甲酸钠 药物别名 英文名称 Foscarnet sodium 说明 输液。 功用作用 本品为无机焦磷酸盐的有机同系物。在体外有抑制疱疹病毒DNA聚合酶的作用，包括细胞肥大病毒、单纯疱疹病毒HSV-1和HSV-2、人疱疹病毒HHV-6、EB病毒（EBV）和水痘-带状疱疹病毒（VZV）。按 $57 \pm 6\text{mg} / \text{kg}$ 量滴注...。本文重点关注甲酸 mol 磷酸盐 病毒 等内容，您可以在本页对膦甲酸钠进行讨论【关键字】抗病毒类.甲酸.mol.磷酸盐.病毒.膦甲酸钠【全文】药物名称 膦甲酸钠药物别名 英文名称 Foscarnet sodium说明 输液；每瓶600mg（250md）；1200mg（500ml）。 功用作用 本品为无机焦磷酸盐的有机同系物。在体外有抑制疱疹病毒DNA聚合酶的作用，包括细胞肥大病毒、单纯疱疹病毒HSV-1和HSV-2、人疱疹病毒HHV-6、EB病毒（EBV）和水痘-带状疱疹病毒（VZV）。本品的血浆蛋白结合率为14%～17%。按 $57 \pm 6\text{mg} / \text{kg}$ 量滴注，每日3次，第1日 C_{max} 为573（213～1305） $\mu\text{mol} / \text{Lmin}$ ， C_{min} 为78（<33～139） $\mu\text{mol} / \text{L}$ 。连用2周后 C_{max} 变化不大， C_{max} 则为110（43～148） $\mu\text{mol} / \text{L}$ 。平均血浆清除率为 130 ± 44 或 $178 \pm 48\text{ml} / \text{min}$ 。主要用于爱滋病患者的细胞肥大病毒性鼻炎。用法用量 初始剂量 $60\text{mg} / \text{kg}$ ，每8小时1次，至少1小时恒速滴入，用2～3周；剂量、给药间隔、连续应用时间须根据病人的肾功能与用药耐受程度予以调节。维持量

为每日90 ~ 120mg / kg , 静滴2小时。肾功能不足者需减量用药。注意事项可引起多系统的不良反应 , 较常见的有发热、乏力、寒战、衰弱、不适、疼痛、感染、毒血症 ; 头痛、感觉异常、头昏、肌不随意收缩、感觉减退、神经病、癫痫发作 ; 厌食、恶心、腹泻、呕吐、腹痛 ; 贫血、粒细胞减少、白细胞减少 , 盐电解质失衡 (包括低血钾、低血钙、低血镁、低磷酸盐血症或高磷酸盐血症) ; 抑郁、精神错乱、焦虑 ; 咳嗽、呼吸困难 ; 皮疹、多汗 ; 肾功能改变 ; 视觉异常等 (以上发生率在5%以上) 。转贴于 : 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com