

美国棉花现货市场情况介绍(7) PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/227/2021_2022__E7_BE_8E_E5_9B_BD_E6_A3_89_E8_c33_227087.htm (一) 棉花种植区域
美国的棉花生长区域主要分布在美国国土南部自西向东的大片区域内，主要的四个棉花生长区为：东南部地区、中南部地区、西南部地区和西部地区。1.东南部地区。包括阿拉巴马州、佐治亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、佛罗里达州和弗吉尼亚州。这一区域种植的棉花约占美国棉花总量的24%，同时也是美国国内纺织业最发达的地区。棉花的生长周期是从四月初到九月初，有大约20%的棉花需要灌溉，收获期是从九月底开始一直持续到十二月初。此且区域内棉花纤维平均长度超过1 - 1/16英寸，以中低等级棉花为主。2.中南部地区。包括阿肯色州、路易斯安那州、密西西比州、密苏里州和田纳西州。这一区域棉花产量约占美国总产量的32%，以供应国内消费使用为主，出口量极少。生长周期是从四月中旬一直延续到九月初，有大约35%的区域需要灌溉，棉花的平均纤维长度超过1 - 3/32英寸，收获期是在九月底到十二月初之间。3.西南部棉区。包括堪萨斯州、俄克拉荷马州和德克萨斯州，棉花产量约占总产量的24%，有近30%的棉花需要灌溉。本区域是美国棉花的主要出口地，一半以上的棉花用于出口，在国际市场上被称为M/O/T的棉花即是此区域的棉花。棉花质量以中低等级为主，平均纤维长度低于1 - 1/16英寸。得克萨斯州南部棉区棉花播种从二月底开始，收获是从七月底到九月中旬，其余地区中旬开始播种，收获从十月中旬开始到十二月结束。4.西部棉区。包括亚利

桑那州、加利福尼亚州和新墨西哥州。本区域是美国高等级棉花的生产基地。这一区域又分为两类，一类是美国著名的SJV Acala棉花，这是美国棉花中品质最好的棉花。它生长于纵贯加利福尼亚州中部的圣纽昆峡谷，一般平均长度高于1 - 1/8英寸，强力不低于30GPT，细度在4.2左右，长度整齐度在82%以上，三级以上棉花占到80%。另一类是C/A棉花，生产于加利福尼亚/亚利桑那州地区，品级较高，但又稍低于SJV棉花，一般三级以上棉花占75%，平均长度高于1 - 3/32英寸。该区域最大的特点就是所有棉花都需要灌溉，收获期从九月底一直到十二月初。（二）美国陆地棉产量在所有产棉州中，陆地棉是种植的主要品种，其产量也占居主导地位

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com