

口腔颌面外科学（A1型题）集锦2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/230/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E9_A2_8C_E9_c112_230609.htm

- 61、通常所说的颞下颌“关节强直”指的是不是：A、真性关节强直 B、关节内强直 C、关节内纤维性粘连 D、关节内骨性粘连 E、颌间挛缩
- 62、以下关于三叉神经痛的叙述哪项是错误的：A、三叉神经痛分原发性和继发性两种 B、疼痛可自发，也可由刺激“扳机点”引起 C、原发性三叉神经痛病员无论病程长短，神经系统检查极少有阳性体征 D、角膜反射的改变常提示为症状性或器质性三叉神经痛 E、目前治疗三叉神经痛的首选药物是苯妥英钠
- 63、以下关于面神经麻痹的叙述哪项是错误的：A、分原发性和继发性两种 B、贝尔麻痹指临床上不能肯定病因的不伴有其他症状或体征的单纯性周围面神经麻痹 C、面神经损害如发生在茎乳孔外，一般不发生味觉、泪液、唾液等方面的变化 D、贝尔面瘫急性期不宜应用强的刺激疗法 E、预后主要取决于病情严重程度和治疗是否及时得当
- 64、以下关于唇裂、腭裂的叙述哪项是错误的：A、外科手术整复是主要的治疗方法 B、应采用综合序列治疗来达到功能与外形的恢复 C、唇裂病员无法形成“腭咽闭合” D、腭裂病员术后应作语音训练 E、颌骨继发畸形的治疗常在16岁以后进行
- 65、以下关于牙颌面畸形的叙述哪项是错误的：A、牙颌面畸形患者必然存在错合 B、正颌外科是以研究和诊治牙颌面畸形为主要内容的学科 C、常见的颌骨发育畸形包括发育过度与发育不足两大类 D、畸形可以是对称的或不对称的 E、错合完全可以反映和代表牙颌面畸形基本的病变特

征 66、 以下关于血管吻合的基本要求中，哪项是错误的： A、 吻合口的血管内膜应紧密接触 B、 没有血管外膜植入吻合口 C、 吻合口不产生狭窄 D、 吻合后的血管应无张力 E、 针距边距大小对吻合效果影响不大 67、 以下关于游离皮片移植的叙述哪项是错误的： A、 按皮肤厚度分为表层皮片、中厚皮片及全厚皮片三种 B、 中厚皮片包括表皮及真皮全层 C、 皮片愈薄生活力愈强，移植后收缩愈大 D、 面颈部移植皮多采用全厚或厚中厚皮片 E、 有感染的肉芽创面或骨面只能采用表层皮片移植 68、 以下关于皮瓣的叙述哪项是错误的： A、 皮瓣感觉的恢复首先为温度觉，最后是痛觉 B、 术后72小时内是游离皮瓣最容易发生血管危象的时候 C、 皮瓣设计应比缺损处稍大，以预防皮瓣转移后发生收缩 D、 原则上组织畸形和缺损能用带蒂皮瓣修复就不用游离皮瓣；能用游离皮瓣就不用管状皮瓣 E、 轴型皮瓣只要在血管的长轴内设计，一般可不受长宽比例的限制 69、 在面部，除血供特别丰富的部位外，随意皮瓣长宽之比通常不超过： A、 1：1 B、 2：1 C、 2~3：1 D、 4~5：1 E、 5~6：1 70、 以下哪项不是下颌横断合片检查的适应证： A、 观察下颌骨体部颊舌侧骨质改变情况 B、 异物及阻生牙定位 C、 观察下颌骨骨折时颊舌向移位情况 D、 观察牙槽突高度的变化情况 E、 颌下腺导管阳性涎石 71、 腺导管的体表投影在： A、 耳垂至鼻翼与口角中点连线前1/3段 B、 耳垂至鼻翼与口角中点连线中1/3段 C、 耳垂至鼻翼与口角中点连线后1/3段 D、 耳垂至鼻翼连线的中1/3段 E、 耳屏至鼻翼连线的后1/3段 72、 面神经出茎乳孔的体表位置在： A、 乳突尖部 B、 乳突尖端下方约1处 C、 乳突根部 D、 乳突前缘中点 E、 茎突尖部 73、 眶下孔的表面解剖

标志在： A、 眶下缘中点下约0.5处 B、 眶下缘下约1.5处 C、
眶下缘外1/3和中1/3交界处 D、 眶下缘中1/3和内1/3交界处 E
、 眶下缘中点和口角连线的中点 74、 舌下腺和颌下腺导管位
于哪个分区： A、 颌下区 B、 舌下区 C、 颊下区 D、 腮腺嚼
肌区 E、 面侧深区 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接
下载。详细请访问 www.100test.com