

抗肿瘤药：烷化剂抗肿瘤药-氮甲 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/231/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_97\\_E8\\_82\\_BF\\_E7\\_98\\_A4\\_E8\\_c23\\_231097.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/231/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_231097.htm) 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】氮甲属于烷化剂抗肿瘤药栏目，主要讲述了药物名称 氮甲 药物别名 甲酰溶肉瘤素

，N-formylsarcolysin，NF 英文名称 Formylmerphalan 说明片剂：每片50mg。其中以睾丸精原细胞瘤的效果最突出，据中国医学科学院肿瘤医院总结该院1960～1969年内治疗的118例结果，近期有效率91。其中 期病人在睾丸切除术后应用氮甲作巩固治疗的14例均观察...。本文重点关注药物 其中 睾丸治疗 等内容，您可以在本页对氮甲进行讨论【关键字】烷化剂抗肿瘤药.药物.其中.睾丸.治疗.氮甲【全文】药物名称 氮甲 药物别名 甲酰溶肉瘤素，N-formylsarcolysin，NF英文名称 Formylmerphalan 说明片剂：每片50mg；100mg。功用作用 临床上曾试用于多种常见肿瘤。其中以睾丸精原细胞瘤的效果最突出，据中国医学科学院肿瘤医院总结该院1960～1969年内治疗的118例结果，近期有效率91.3%，全组10年生存率为65.3%。其中 期病人在睾丸切除术后应用氮甲作巩固治疗的14例均观察10年以上无复发； 、 期及复发病例有相当多的病人已生存25年以上，大部恢复了正常工作，有的治后生育子女。本品对多发性骨髓瘤也有较明显的疗效，缓解期也较长。对淋巴瘤也有效，但显效较慢，可作为维持治疗。用法用量 成人每日剂量150～200mg（3～4mg/kg）分3～4次或睡前1次口服，一疗程总量6～8g 注意事项 主要不良反应为消化道反应如食欲不振、恶心，少数病人有呕吐和腹泻，其

他尚可有无力和头昏等，但多较轻。骨髓抑制以白细胞下降较明显，部分病人有血小板下降。一般在停药后2~3周血象即可恢复。对血红蛋白影响不大。对肝肾功能无损害。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)