

抗肿瘤药：烷化剂抗肿瘤药-环磷酰胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/231/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_97\\_E8\\_82\\_BF\\_E7\\_98\\_A4\\_E8\\_c23\\_231100.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/231/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_231100.htm) 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】环磷酰胺属于烷化剂抗肿瘤药栏目，

主要讲述了 药物名称 环磷酰胺 药物别名 英文名称

Compound Cyclophosphamide。4元/支 功用作用 用于恶性淋巴瘤，急慢性淋巴细胞白血病等，也用于卵巢癌，乳腺癌，精原细胞瘤，多发性骨髓瘤，头颈部肿瘤等。本品如与硫酸长春新碱或洛莫司汀（CCNU）等联合应用于急性白血病能提高疗效。有效用法用...。本文重点关注药物 用于 白血病 注射 等内容，您可以在本页对环磷酰胺进行讨论【关键字】烷化剂抗肿瘤药.药物.用于.白血病.注射.环磷酰胺【全文】药

物名称 环磷酰胺 药物别名 英文名称 Compound Cyclophosphamide.说明 规格价格：0.2g/支；4元/支 功用作用

用于恶性淋巴瘤，急慢性淋巴细胞白血病等，也用于卵巢癌，乳腺癌，精原细胞瘤，多发性骨髓瘤，头颈部肿瘤等。本品如与硫酸长春新碱或洛莫司汀（CCNU）等联合应用于急性白血病能提高疗效。有效用法用量 临用前用氯化钠注射液5-10毫升溶解后，立即注射。静脉注射一次0.2克，一日1次或隔日1次，总量8~10克为一疗程。注意事项 常见的副反应有胃肠道反应和骨髓抑制症状，表现为食欲不振，恶心、呕吐、白细胞和血小板减少，脱发也常见，亦可出现膀胱炎引起的尿频尿急，血尿等症状，偶有肝功能损伤引起黄疸，用药期间应严格检查血象，肝、肾功能障碍者慎用。明显恶液质者忌用，严格防止吸入或皮肤接触本品粉末。 转贴于：

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)