

抗肿瘤药：烷化剂抗肿瘤药-盐酸氮芥 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/232/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_232777.htm 【摘要】盐酸氮芥属于烷化剂抗肿瘤药栏目，主要讲述了药物名称 盐酸氮芥 药物别名 氮芥，恩比兴 Mustine，Embichin，Nitrogen Mustard 英文名称 Chlormethine Hydrochloride 说明 注射剂：1ml：5mg、2ml：10mg。功用作用 恶性淋巴瘤与肺癌，头颈癌，霍奇金病，腔内注射用于癌性胸水。用法用量 静脉注射，每次按体重0.1mg~0.2mg/kg，1次~2次/周，总量30mg~60mg/疗程，疗程间歇宜超过2周~4周。腔内注射，每次按体重0.2mg~0.4mg/kg，溶于20ml~40ml生理盐水中，抽去腔内积液注入，注入后5min内应多次交换体位，以使药液在腔内分布均匀，1次/周，不超过4次~5次。[药物过量]剂量按体重超过0.6mg/kg可导致中枢神经系统毒性，严重骨髓抑制及心脏毒性。注意事项 孕妇禁用。长期使用易发生继发性肿瘤。定期检查白细胞与血小板计数及肝肾功能。凡有骨髓抑制、感染、肿瘤细胞侵及骨髓、曾接受过多程化疗或放疗者应慎用

。对本品过敏者禁用。本品剂量限制性毒性为骨髓抑制，故应密切观察血象变化，每周查血象1~2次。氮芥对局部组织刺激性强，若漏出血管外，可导致局部组织坏死，故严禁口服、皮下及肌肉注射，药物一旦溢出，应立即用硫代硫酸钠注射液或1%普鲁卡因注射液局部注射，用冰袋冷敷局部6~12小时。氮芥水溶液极易分解，故药物开封后应在10分钟内注入体内。[孕妇及哺乳期妇女用药]本品有致突变或致畸胎作用，可造成胎儿死亡或先天畸形，特别是妊娠初期的三个月内。故孕妇及哺乳期妇女禁用或慎用。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com