

抗肿瘤药：烷化剂抗肿瘤药-二溴甘露醇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/232/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_97\\_E8\\_82\\_BF\\_E7\\_98\\_A4\\_E8\\_c23\\_232778.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/232/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_232778.htm) 【摘要】二溴甘露醇属于烷化剂抗肿瘤药栏目，主要讲述了药物名称二溴甘露醇 药物别名 DBM Mitobronitol 英文名称 Dibromomannitol 说明 胶囊：0。 功用作用 慢性粒细胞白血病、何杰金氏病、真性红细胞增多症。 用法用量 口服，500mg/日，分3次服，3~6周为一疗程。 维持量自200mg/日至每周200mg，根据血中白细胞数进行调整，当白细...。 本文重点关注甘露醇 药物作用 口服 等内容，您可以在本页对二溴甘露醇进行讨论【关键字】烷化剂抗肿瘤药.甘露醇.药物.作用.口服.二溴甘露醇【全文】药物名称 二溴甘露醇 药物别名 DBM Mitobronitol 英文名称 Dibromomannitol 说明 胶囊：0.5g。 功用作用 慢性粒细胞白血病、何杰金氏病、真性红细胞增多症。 用法用量 口服，500mg/日，分3次服，3~6周为一疗程。 维持量自200mg/日至每周200mg，根据血中白细胞数进行调整，当白细胞降至 $2 \times 10^9/L$ 时改为每2~3日口服0.125~0.25g，连用12周。 注意事项 骨髓抑制可发生白细胞及血小板下降。肾功能不全及出血体质者禁用。本品有较强的蓄积作用，需定期检查血象。有出血素质者禁用。 [孕妇及哺乳期妇女用药] 应禁用。 转贴于：[100Test](http://www.100test.com) 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)