

抗肿瘤药：烷化剂抗肿瘤药-福莫司汀 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/232/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_232779.htm 【摘要】福莫司汀属于烷化剂抗肿瘤药栏目，主要讲述了药物名称 福莫司汀 药物别名 武活龙 英文名称 fotemustine 说明 注射用冻干粉剂：208。单一药物化疗包括诱导治疗：连续用药3次，各间隔1周。然后是治疗休息期4~5周。维持治疗：每3周用药1次。本文重点关注药物 诱导 治疗 用药 等内容，您可以在本页对福莫司汀进行讨论【关键字】烷化剂抗肿瘤药.药物.诱导.治疗.用药.福莫司汀【全文】药物名称 福莫司汀 药物别名 武活龙 英文名称 fotemustine 说明 注射用冻干粉剂：208.0mg/瓶；200mg/4mL。淡黄色冻干粉末，易溶于乙醇和水，对光敏感。避光，2~8 贮存。功用作用 原发性脑内肿瘤和播散性恶性黑色素瘤（包括脑内部位）。用法用量 准确取4mL无菌的酒精溶媒，溶解小瓶中的福莫司汀，剧烈振摇，直到粉剂完全溶解，将福莫司汀溶液加入5%的葡萄糖溶液250mL，作静脉滴注。依此法制备药液时时应避光，静脉缓慢滴注1h。单一药物化疗包括诱导治疗：连续用药3次，各间隔1周；然后是治疗休息期4~5周；维持治疗：每3周用药1次。标准剂量均为100mgm⁻²。在联合化疗时，免去诱导治疗的第3次用药，剂量仍维持不变。注意事项 怀孕及哺乳期妇女禁用。不推荐将本品用于过去4周内用过化疗或6周内用过亚硝基脲类药物治疗的患者。本品只可考虑用于血小板和/或粒细胞计数分别 $1 \times 10^{12}L^{-1}$ 和 $2 \times 10^9L^{-1}$ 的患者。每次用药前，都应做血细胞计数，并根据血液学状态调整剂量。从诱导

治疗开始到维持治疗开始，推荐的间隔是8周，在2个维持治疗周期之间，推荐的间隔期是3周。推荐在诱导治疗中或后进行肝功能检查。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com