

抗肿瘤药：烷化剂抗肿瘤药-苯丙氨酸氮芥 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/232/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_97\\_E8\\_82\\_BF\\_E7\\_98\\_A4\\_E8\\_c23\\_232781.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/232/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_232781.htm) 【摘要】苯丙氨酸氮芥属于烷化剂抗肿瘤药栏目，主要讲述了药物名称 苯丙氨酸氮芥 药物别名 爱克兰 Alkeran 葛兰素威康GlaxoWellcome 英文名称 melphalan 说明片剂2mg 功用作用 多发性骨髓瘤，晚期卵巢腺癌，部分晚期乳腺癌，真性红细胞增多症。多发性骨髓瘤 150 μg/kg体重/日，分次服用，共4日，6周后重复疗程。乳腺癌 150 μg/kg体重/日，...。本文重点关注苯丙氨酸氮芥 骨髓抑制剂量 等内容，您可以在本页对苯丙氨酸氮芥进行讨论【关键字】烷化剂抗肿瘤药.苯丙氨酸氮芥.骨髓.抑制.剂量.苯丙氨酸氮芥【全文】药物名称 苯丙氨酸氮芥 药物别名 爱克兰 Alkeran 葛兰素威康GlaxoWellcome英文名称 melphalan说明片剂2mg 功用作用 多发性骨髓瘤，晚期卵巢腺癌，部分晚期乳腺癌，真性红细胞增多症。用法用量 不可分割本药药片。多发性骨髓瘤 150 μg/kg体重/日，分次服用，共4日，6周后重复疗程。与强的松合用可能比单用本药更有效。对治疗有反应者延长疗程超过1年不会改进疗效。晚期卵巢腺癌 200 μg/kg体重/日，分3次服用，共5天，每4-8周重复。乳腺癌 150 μg/kg体重/日，或6 mg/m<sup>2</sup>，共5日，每6周重复，发现骨髓抑制时减低剂量。真性红细胞增多症 诱导缓解期：6-10 mg/日，共5-7日，之后可2-4 mg/日，直至症状控制。维持剂量：2-6 mg，每周1次。用药过量：症状 胃肠道反应：恶心、呕吐，偶见胃肠道粘膜损伤及腹泻，有时甚至出血。骨髓抑制引起的白血球和血小板减少及贫血。治疗 给予对

症支持疗法，必要时输血和血小板，并给予抗感染药及血液生长因子。需严密观察血象最少4星期。注意事项 对本药有过敏史的病人禁用。近期接受放疗或其它化疗之病人，中至重度肾功能不全患者慎用，起始剂量应减半，随后的剂量应根据骨髓抑制情况而定。密切监测血球计数，以免过度抑制骨髓功能，停药后血球仍会持续减少一段时间，故此若发现血球计数出现大幅度下降，应暂时停药。致癌、致畸性及对生育能力的影响 临床证实本药能增加白血病发病率。接受本药治疗的病人，其后代有出现先天性畸形的可能性。本药有抑制卵巢的作用，可引起月经紊乱或绝经，此外可影响精子的生成，能令男病人有短暂或永久不育。对妊娠和哺乳的影响 孕妇不能接受本药治疗，特别是怀孕首3个月，病人及其伴侣应采取可靠的避孕措施，接受本药治疗的妇女须停止哺乳。 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)