

抗肿瘤药：抗生素类抗肿瘤药-吡柔比星 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/233/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c67_233948.htm 【摘要】吡柔比星属于抗生素类抗肿瘤药栏目，主要讲述了功用作用 急性非淋巴细胞白血病、恶性淋巴瘤，亦用于乳腺癌、胃癌、膀胱癌等。用法用量 将本品加入5%葡萄糖注射液或注射用水10ml溶解。可静脉、动脉、膀胱内注射。静注：每3周~4周为1治疗周期，每疗程用药1次，40mg~60mg/次，或30mg~40mg/日，连用2日。。本文重点关注注射 溶解 膀胱 疗程 等内容，您可以在本页对吡柔比星进行讨论【关键字】抗生素类抗肿瘤药.注射.溶解.膀胱.疗程.吡柔比星【全文】药物名称 吡柔比星 药物别名 吡喃阿霉素 Theprubicin 英文名称 Pirarubicin 说明 粉针剂：10mg、20mg。功用作用 急性非淋巴细胞白血病、恶性淋巴瘤，亦用于乳腺癌、胃癌、膀胱癌等。用法用量 将本品加入5%葡萄糖注射液或注射用水10ml溶解。可静脉、动脉、膀胱内注射。静注：每3周~4周为1治疗周期，每疗程用药1次，40mg~60mg/次，或30mg~40mg/日，连用2日。静注：一般按体表面积一次25~40mg/m²；动脉给药：如头颈部癌按体表面积一次7~20 mg/m²，一日1次，共用5~7日，亦可每次14~25 mg/m²，每周一次；膀胱内给药：按体表面积一次15~30 mg/m²，稀释为500~1000 μg/ml浓度，注入膀胱腔内保留1~2h，每周3次为一疗程，可用2~3疗程。注意事项 孕妇及心功能异常或有心功能异常史的病人禁用。严重器质性心脏病或心功能异常者及对本品过敏者禁用。严格避免注射时渗漏至血管外，密切监测心脏、血象、肝肾功能及

继发感染等情况。原则上每周期均要进行心电图检查，对合并感染、水痘等症状的患者应慎用本药，高龄者适当减量。溶解本品只能用5%葡萄糖注射液或注射用水，以免pH的原因影响效价或浑浊。溶解后药液，即时用完，室温下放置不得超过6小时。 [孕妇及哺乳期妇女用药]孕妇及哺乳期妇女禁用。 [老年患者用药]高龄者酌情减量。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com