

抗肿瘤药：抗生素类抗肿瘤药-博来霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/235/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_235476.htm 【摘要】博来霉素

属于抗生素类抗肿瘤药栏目，主要讲述了药物名称 博来霉素 药物别名 争光霉素、博莱霉素 Bleocin，BL 英文名称

Bleomycin 说明 粉针剂：10mg。功用作用 头颈部、食管、皮肤、宫颈、阴道、外阴、阴茎的鳞癌和霍其金病及恶性淋巴瘤、睾丸癌等，亦可用于治疗银屑病。淋巴瘤病人易引起高热、过敏、休克，用药前应作好充分准备。。本文重点关注

博来霉素 药物 霉素 淋巴瘤 等内容，您可以在本页对博来霉素进行讨论【关键字】抗生素类抗肿瘤药.博来霉素.药物.霉素.淋巴瘤.博来霉素【全文】

药物名称 博来霉素 药物别名 争光霉素、博莱霉素 Bleocin，BL英文名称 Bleomycin 说明 粉针剂：10mg。功用作用 头颈部、食管、皮肤、宫颈、阴道、外阴、阴茎的鳞癌和霍其金病及恶性淋巴瘤、睾丸癌等，亦可用于治疗银屑病。

用法用量 肌内、静脉及动脉注射，成人15mg/次，1次/日或2次~3次/周，总量不超过400mg；小儿每次按体表面积10mg/m²。第1次用药时，先肌注1/3量，若无反应再将全部剂量注射完。静脉注射应缓慢，不少于10min。

注意事项 妊娠D类，孕妇与哺乳期妇女禁用。70岁以上老年病人、肺功能损害及肝肾功能损害者慎用，发热病人及白细胞低于 $2.5 \times 10^9/L$ 者禁用。不宜用于肺部放射治疗病人。淋巴瘤病人易引起高热、过敏、休克，用药前应作好充分准备。

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com