

抗肿瘤药：抗生素类抗肿瘤药-多柔比星 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/235/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_235481.htm

【摘要】多柔比星属于抗生素类抗肿瘤药栏目，主要讲述了功用作用急性白血病（淋巴细胞性和粒细胞性）、霍奇金病及恶性淋巴瘤、乳腺癌、支气管肺癌、卵巢癌、软组织肉瘤、成骨肉瘤、横纹肌肉瘤、尤文肉瘤、肾母细胞瘤、神经母细胞瘤、膀胱癌、甲状腺癌、前列腺癌、头颈部鳞癌、睾丸癌、胃癌、肝癌等。

用法用量 静脉或动脉缓慢注射，临用前加生理盐水溶解（浓...。本文重点关注肉瘤用量浓度剂量等内容，您可以在本页对多柔比星进行讨论【关键字】抗生素类抗肿瘤药.肉瘤.用量.浓度.剂量.多柔比星【全文】药物名称 多柔比星药物别名

阿霉素、羟柔红霉素、羟正定霉素、ADR Adriamycin

，ADM英文名称 Doxorubicin说明 粉针剂：10mg、50mg。功用作用急性白血病（淋巴细胞性和粒细胞性）、霍奇金病及恶性淋巴瘤、乳腺癌、支气管肺癌、卵巢癌、软组织肉瘤、成骨肉瘤、横纹肌肉瘤、尤文肉瘤、肾母细胞瘤、神经母细胞瘤、膀胱癌、甲状腺癌、前列腺癌、头颈部鳞癌、睾丸癌、胃癌、肝癌等。用法用量 静脉或动脉缓慢注射，临用前加生理盐水溶解（浓度为2mg/ml），成人50mg~60mg/次，1次/3周~4周，或20mg~30mg/周，连用3周，停用2周~3周后重复；儿童用量约为成人的一半；总剂量按体表面积不宜注意事项 妊娠D类，妊娠、哺乳期妇女禁用。肝功能不全者的用量应予酌减。本品可用于浆膜腔内给药和膀胱灌注，在进行纵隔或胸腔放疗期间禁用。每周分次用药的心肌毒性、骨

髓抑制和胃肠道反应（包括口腔溃疡）较每3周用药1次为轻。细胞内本品浓度在长期维持于低血浆浓度时作用可大为增强，因而有人主张本品宜用持续点滴给药法。本品的肝清除量较高，适用于局部化疗如肝动脉插管给药或腹腔内化疗。周围血象中白细胞或血小板低、发热或伴明显感染、恶液质、失水、出血、电解质或酸碱平衡失调、胃肠道梗阻、明显黄疸或肝肾功能及心肺功能不全者均禁用本品。肝肾功能损害，用量应酌减。2岁以下幼儿和大于60岁的老年病人慎用，且用药剂量应相应减少。以往做过胸部放射治疗或用过大剂量环磷酰胺者，本品的每次用量和总累积剂量均应相应减少。在用药期间和周围血象白细胞减少时禁行牙科手术（包括拔牙），并要保证每日有足够的排尿量。用药期间及停用本品后3个月~6个月内禁行病毒疫苗接种。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com