

2007年国家临床执业助理医师资格考试习题二十六 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/236/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_9B\\_BD\\_c22\\_236356.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/236/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E5_9B_BD_c22_236356.htm)

2007年国家临床执业助理医师资格考试习题答案二十六第七章 妇产科学第十一单元 分娩期并发症A1型题

下列先兆子宫破裂不符合的是A．发现尿血B．发现病理缩复环C．子宫下段压痛明显D．胎心节律不齐E．已下降的胎儿先露部分上升，宫颈口回缩

2．出现先兆子宫破裂时应立即A．吸氧B．补液C．剖宫产D．行穿颅术E．行产钳术

3．羊水进入母体循环最常见的途径为A．子宫颈管粘膜的静脉B．子宫体部内膜静脉C．不正常开放的子宫血管D．胎盘附着处的血窦E．剖宫产子宫切口处开放的血管

4．下述脐带异常最易引起分娩时胎儿发生宫内窘迫的是A．脐带过长B．脐带先露C．脐带过短D．脐带假结E．脐带扭转

5．关于产后出血的定义正确的是A．胎儿娩出后的24小时内阴道流血 $>500\text{ml}$ B．胎盘娩出后阴道出血 $>500\text{ml}$ C．胎儿娩出后阴道流血 $>500\text{ml}$ D．分娩过程中的失血量 $>500\text{ml}$ E．产后24小时后到产后42天阴道流血 $>500\text{ml}$

6．产后出血最常见的原因是A．子宫颈裂伤B．胎盘部分剥离C．胎盘残留D．子宫收缩乏力E．凝血机制障碍

7．下述哪项不是产后出血的原因A．双胎妊娠B．滞产C．子宫畸形D．多次刮宫人流术后E．胎膜早破

8．出现产后出血不易被立即发现的是A．胎盘滞留B．胎盘嵌顿C．胎盘植入D．胎盘粘连E．胎盘剥离不全

9．关于子宫收缩乏力性产后出血首选的处理是A．子宫切除B．按摩子宫并注射宫缩剂C．双手压迫腹部按摩子宫D．压迫腹主动脉E．乙醚刺激

A2型题

12．某初产妇妊娠40周，估计胎儿体重可

达4000g，因宫口开大缓慢，以5%葡萄糖缩宫素5单位静脉点滴，但产妇烦躁不安，疼痛难忍，腹部检查发现病理缩复环且有压痛，胎心尚在正常E．肝素17．孕妇，25岁，妊娠39周。上午8点开始阵发性宫缩，10点胎膜破裂，下午16时肛门检查：宫口已开全，胎头先露，胎位LOA，胎头颅骨最低点在坐骨棘水平以下3厘米，胎心率100次/分，羊水呈草绿色，粘稠。应如何处理A．产钳术B．剖宫产C．等待自然分娩D．加腹压E．静点缩宫素转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)