

2007年国家临床执业医师资格考试习题二十五 PDF转换  
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/236/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_9B\\_BD\\_c22\\_236357.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/236/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E5_9B_BD_c22_236357.htm)

2007年国家临床执业医师资格考试习题答案二十五第七章 妇产科学第六单元 正常分娩AI型题

1. 有关分娩机制正确的是A. 衔接是指颅骨最低点接近坐骨棘水平B. 正常情况下胎头以面先露入盆C. 下降是连续性贯穿于分娩全过程D. 内旋转动作在第一产程末完成E. 子宫收缩力和腹压两者合力而发生仰伸
2. 临产的主要标志是A. 不规则宫缩B. 见红C. 规律性宫缩，阴道流血D. 规律性宫缩，宫颈口扩张E. 规律性宫缩并逐渐加强，伴宫颈口扩张和胎先露下降
3. 下述哪种情况可以灌肠A. 经产妇宫口开至1cmB. 子宫收缩甚强C. 胎儿宫内窘迫D. 重度子痫前期E. 妊娠合并心脏病
4. 下述哪项不是软产道的组成部分A. 子宫体B. 子宫下段C. 子宫颈D. 阴道E. 盆底软组织
5. 决定分娩的三要素中错误的是A. 子宫收缩力是分娩的主要力量B. 子宫上段肌肉产生有规律的阵发性收缩称阵缩C. 子宫收缩有对称性D. 子宫收缩上段弱、下段强，称极性E. 子宫体部肌纤维收缩时变短、变粗，间歇时放松，但不恢复到原来长度而较前略短称缩复作用
6. 在分娩机转中，肛提肌对分娩的作用不包括A. 协助胎头内旋转B. 协助胎盘娩出C. 使胎头俯屈D. 使胎头仰伸E. 使胎头复位外旋转
7. 关于分娩的先兆症状错误的是A. 见红多在分娩开始前24~48小时B. 见红是分娩即将开始一个比较可靠的征象C. 初产妇见红血量比经产妇多D. 假阵缩的特点是持续时间短且不恒定，常夜间出现，清晨消失E. 度冷丁能抑制假阵缩
8. 第一产程

中用温肥皂水灌肠哪项禁忌是错误的A．胎膜早破B．见红C．心脏病，心功能Ⅱ级D．胎位异常E．初产妇宫口扩张4Cm以上

9．接生过程中错误的处理是A．宫缩时，协助胎头俯屈B．协助胎头俯屈，是变枕下前凶径为枕额径C．应让胎头在宫缩间歇期娩出D．胎肩娩出后，仍应注意保护会阴E．宫缩时，接生者以手掌大鱼际肌向上内方托压会阴体

10．正常分娩时最主要的产力是A．子宫收缩力B．肛提肌收缩力C．腹肌收缩力D．膈肌收缩力E．骨骼肌收缩力

11．下列哪项不是胎盘剥离的征象A．宫底上升B．子宫呈葫芦形C．阴道少量出血D．外露脐带延长E．压耻骨联合上方，脐带不回缩

14．关于分娩分期的叙述错误的是A．总产程是指规律性宫缩开始至胎儿娩出为止B．第一产程初产妇需12～16hC．第二产程是从宫口开全到胎儿娩出D．第三产程不超过30minE．第二产程经产妇需1h或数分钟

15．有关破膜的处理错误的是A．破膜后即听胎心B．记录破膜时间C．注意羊水性状D．胎头尚未入盆者，破膜后应卧床休息E．破膜超过24h，给予抗生素预防感染

16．临产后，阴道检查确诊胎方位时，以哪一条颅缝的方向为准A．额缝B．冠状缝C．矢状缝D．人字缝E．额缝

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)