

2007年国家临床执业医师资格考试习题十九 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/236/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E5_9B_BD_c22_236372.htm

2007年国家临床执业医师资格考试习题答案十九第六章 外科学第十一单元 颈部疾病A1型题

1. 甲亢病人，应稳定于下列哪项即可手术
- A. 心率小于70次/分，基础代谢率小于35%
 - B. 心率小于80次/分，基础代谢率小于10%
 - C. 心率小于90次/分，基础代谢率小于20%
 - D. 心率小于100次/分，基础代谢率小于20%
 - E. 心率小于110次/分，基础代谢率小于25%
2. 下列基础代谢率的计算公式最常用的是
- A. $\text{基础代谢率} = \text{脉率} \times \text{脉压} - 111$
 - B. $\text{基础代谢率} = \text{脉率} \times \text{脉压} - 111$
 - C. $\text{基础代谢率} = \text{脉率} - \text{脉压} - 111$
 - D. $\text{基础代谢率} = 111 - \text{脉率} - \text{脉压}$
 - E. $\text{基础代谢率} = (\text{脉率} - \text{脉压}) \times 111$
3. 有关甲状腺手术后导致呼吸困难的原因，不包括下列哪一项
- A. 伤口内出血、压迫气管
 - B. 双侧喉上神经损伤
 - C. 双侧喉返神经损伤
 - D. 急性喉头水肿
 - E. 气管软化、塌陷
4. 有关甲亢的临床表现，下列哪一项是错误的
- A. 甲状腺弥漫性肿大
 - B. 心悸伴心慌
 - C. 消瘦、体重减轻
 - D. 精神萎靡、嗜睡
 - E. 两手颤动
5. 下列哪一项不适宜施行甲状腺大部切除术
- A. 中度原发性甲亢并发心律不齐
 - B. 甲亢伴有气管压迫症状
 - C. 青少年甲亢
 - D. 继发性甲亢
 - E. 单纯性甲状腺肿
6. 甲状腺内孤立的、无触痛性、不规则的硬结节最可能的是
- A. 结节性甲状腺肿
 - B. 急性甲状腺炎
 - C. 甲状腺癌
 - D. 硬化性甲状腺炎
 - E. 甲状腺脓肿
7. 关于甲状腺结节的鉴别诊断，下列哪项是错误的
- A. 儿童时期出现的甲状腺结节，50%为恶性
 - B. 年轻男性的单个结节要警惕恶性的可能
 - C. 过去甲状

腺正常，突然发生结节，且短期发展较快，恶性的可能性大D．甲状腺扫描为“冷结节”者即可诊断E．“热结节”常提示为高功能腺瘤，一般不恶变A2型题8．年轻人的单纯性甲状腺肿，如无其他症状，治疗应首先考虑A．甲状腺次全切除术B．多食含碘丰富的海带、紫菜C．小量甲状腺素D．碘治疗E．无需治疗，门诊观察9．女性，30岁，颈前肿块多年，近1个月来，肿块生长迅速，并出现声音嘶哑，颈前可触及2Cm×3Cm肿块，质地较硬，表面欠光滑。诊断首先考虑A．甲状舌骨囊肿B．结节性甲状腺肿单发结节C．甲状腺腺瘤囊内出血D．甲状腺癌E．慢性甲状腺炎10．女，25岁，无意中发发现甲状腺肿块7天，近3天来肿块迅速增大，伴有胀痛。甲状腺ECT检查：甲状腺右叶“冷结节”。应初步诊断为：A．单纯性甲状腺肿B．结节性甲状腺肿C．甲状腺腺瘤D．甲状腺癌E．甲状腺囊腺瘤并囊内出血11．男性，31岁，因甲亢行甲状腺次全切除术，术后第2天，饮水时发生误咽，继出现声调降低，但无声音嘶哑，下列最可能的是A．喉上神经内外支损伤B．一侧喉上神经内侧支损伤C．一侧喉上神经外侧支损伤D．喉返神经损伤E．喉头水肿12．女，18岁，甲状腺弥漫性肿大，无突眼。甲状腺摄¹³¹I试验：2小时20%，24小时45%。清晨空腹测定脉搏80次/分，血压120/80mmHg，SPECT检查甲状腺无结节。最可能的诊断是：A．甲状腺功能减退B．甲状腺功能亢进C．甲状腺炎D．单纯性甲状腺肿E．结节性甲状腺肿A3型题(13—15题共用题干)女性，26岁，一周前当地诊断为“甲状腺功能亢进”，未作进一步的任何治疗，来院就诊，要求手术治疗，查体心率104次/分，血压120/70mmHg。13．此时合理的处理是A．用镇静剂和安

眠药B．服用硫氧嘧啶类药物C．应用普萘洛尔D．应用阿托品E．口服甲状腺素片

14．如甲亢症状已控制，还需哪些术前准备A．继续服用硫氧嘧啶类药物B．限制活动C．高热量、高蛋白饮食D．服用碘剂23周E．注意心率及血压的变化

15．甲状腺术后因血管结扎线脱落出血致呼吸困难，此时适当的处理是A．静脉点滴强力止血药B．请喉科会诊气管切开C．拆去缝线，立即送手术室止血D．血肿穿刺抽血E．局部加压包扎

B型题(16～17题共用题干)A．甲状腺危象B．喉返神经损伤C．喉上神经外支损伤D．喉上神经内支损伤E．术后出血窒息

16．甲状腺术后出现进行性呼吸困难、烦躁的主要原因是

17．甲状腺术后出现误咽的可能原因是(18～19题共用题干)A．甲状腺炎B．结节性毒性甲状腺肿C．弥漫性毒性甲状腺肿D．甲状腺癌E．胶样囊肿

18．女性，55岁，颈前区偶然发现一羸硬、固定的无痛性肿块，应诊断为

19．女性，50岁，颈前弥漫性肿大，不伴其他症状10年，近年来感心悸、多食、易怒，颈前可触及数个结节，随吞咽上下活动应考虑为

贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com