

2007年国家临床执业医师资格考试习题十二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/236/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E5_9B_BD_c22_236384.htm

2007年国家临床执业医师资格考试习题答案十二第五章 内科学第八单元 内分泌及代谢疾病A1 型题

1. 抗利尿激素在下列哪一部位合成A. 腺垂体B. 神经垂体C. 垂体柄D. 下丘脑E. 肾
2. 下列激素中哪一种不是促激素A. ACTHB. TSHC. FSHD. LHE. PRL3. 下列何种激素与人类神经系统发育关系最密切A. 生长激素B. 甲状腺激素C. 肾上腺素D. 肾上腺皮质激素E. 胰岛素
4. 下列何项不是内分泌功能试验的兴奋试验A. ACTH试验B. TRH试验C. 地塞米松试验D. 胰岛素低血糖试验E. 精氨酸试验
5. 实现下丘脑与神经垂体之间的功能联系，依靠A. 垂体门脉系统B. 下丘脑促垂体区C. 下丘脑-垂体束D. 正中隆起E. 下丘脑调节肽
6. 属类固醇激素的是A. 促肾上腺皮质激素B. 肾上腺皮质激素c. 肾上腺髓质激素D. 促甲状腺激素E. 甲状腺激素
7. 垂体微腺瘤是指瘤体直径小于多少的肿瘤A. B. C. D. E.
8. 下列哪一种激素不是在腺垂体合成A. 促甲状腺激素B. 促肾上腺激素C. 促性腺激素D. 抗利尿激素E. 泌乳素
9. 垂体危象时，以下列何种情况最为多见A. 低血糖性昏迷B. 低钾性麻痹c. 谵妄D. 脑梗死E. 高钠高渗性昏迷
10. 成人腺垂体功能减退症最常见的病因是A. 垂体瘤B. 垂体缺血性坏死C. 糖皮质激素长期治疗D. 下丘脑病变E. 蝶鞍区手术、放疗
11. 神经垂体贮存的激素是A. 促甲状腺激素B. 抗利尿激素C. 生长激素D. 促肾上腺皮质激素E. 促性腺激素
12. 严重的腺垂体功能减退症易发生低血糖主

要是缺乏A . PRL及LHB . PRL及TSHC . PRL及ACTHD . GH及TSHE . GH及ACTH13 . 腺垂体功能减退症最早出现的靶腺功能减退是A . 肾上腺皮质功能减退B . 甲状腺功能减退C . 性腺功能减退D . 肾上腺与甲状腺功能减退E . 甲状腺与性腺功能减退14 . 甲巯咪唑(他巴唑)治疗毒性弥漫性甲状腺肿的作用机制是A . 抑制TSH与甲状腺滤泡细胞的受体结合B . 抑制甲状腺球蛋白的分解C . 抑制甲状腺过氧化物酶活性、酪氨酸碘化及碘酪氨酸的偶联D . 抑制甲状腺释放T3、T4E . 抑制T4周围组织中转化为T315 . Graves病最重要的体征是A . 皮肤湿润多汗，手颤B . 眼裂增大，眼球突出c . 弥漫性甲状腺肿大伴血管杂音D . 收缩压升高，舒张压降低E . 心脏扩大，心律不齐

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com