

抗肿瘤药：其它抗肿瘤药-伊立替康 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/236/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_236797.htm 【摘要】伊立替康属于其它抗肿瘤药栏目，主要讲述了药物名称伊立替康 药物别名伊立替康、依利诺替康Irinotecam、Topotec 英文名称Irinotecan 说明功用作用小细胞性肺癌、非小细胞性肺癌、子宫颈癌、卵巢癌等。(注：日本标准)用法用量(1)小细胞性肺癌及非小细胞性肺癌用A法，子宫颈癌、卵巢癌用B法。A法：成人1次100mg/平方...。本文重点关注细胞肺癌 重复 疗程 等内容，您可以在本页对伊立替康进行讨论【关键字】其它抗肿瘤药.细胞.肺癌.重复.疗程.伊立替康【全文】药物名称伊立替康药物别名伊立替康、依利诺替康Irinotecam、Topotec 英文名称Irinotecan说明功用作用小细胞性肺癌、非小细胞性肺癌、子宫颈癌、卵巢癌等。(注：日本标准)用法用量(1)小细胞性肺癌及非小细胞性肺癌用A法，子宫颈癌、卵巢癌用B法。A法：成人1次100mg/平方米，静脉点滴，间隔1周再重复静滴1次，3~4次为1疗程。至少间隔二周再进行下1个疗程。需要重复几个疗程。B法：150mg / 平方米，静脉点滴1次，停药2周。如此重复2~3次为1疗程，至少要停药3周才可进行下1个疗程。可按此法重复进行。剂量可按年龄、体重、病情适当增减。(2)本品使用时，需与500ml以上生理盐水、葡萄糖溶液或电解质输液剂混合后，缓慢静滴90分钟以上。[制剂与规格]水针剂：2ml/瓶，含本品10mg，5ml / 瓶，含本品100mg。[贮藏]在原包装褐色小瓶中室温下避光可保存3年。注意事项转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直

接下载。详细请访问 www.100test.com