

2007年执业医师考试考点精析（内科）五一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/239/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E6_89_A7_c22_239270.htm

第五十一章 钩端螺旋体病【考纲要求】 病原学：病原体； 流行病学：传染源、传播途径、人群易感性； 临床表现：钩体病的临床分型、流感伤寒型的临床表现及后期并发症； 实验室检查：血清学试验； 治疗：病原治疗及赫氏反应的诊断和处理。【考点纵览】

1.病原体主要为钩端螺旋体，我国雨水洪水型主要是拔摩那群，稻田型主要由黄疸出血群引起。2.传染源主要由猪和野鼠。通过皮肤粘膜接触传染。3.临床表现复杂多样，分为流感伤寒型、黄疸出血型、肺出血型、肾衰竭型和脑膜脑炎型。4.实验室检查：常用副凝试验。5.治疗首选青霉素；首剂青霉素后，部分病人出现赫氏反应，主张首剂青霉素以小剂量为宜。庆大霉素、四环素也有较好疗效。【历年考题点津】

1.用青霉素G治疗钩端螺旋体病时，应注意A.首次给予大剂量B.首次给予小剂量C.与链霉素联合应用D.与磺胺嘧啶联合应用E.疗程10天以上答案：B（2~4题共用题干）

男，29岁，3天来发热、头痛、乏力、食欲减退，行走时小腿疼痛，伴有咳嗽。体检：体温39.8℃，面色潮红，结膜充血，视力正常，双侧腹股沟淋巴结肿大，腓肠肌压痛明显，无脑膜刺激征及病理反射。肝肋下1.5cm。白细胞 $12.7 \times 10^9/L$ ，N0.74，L0.21

，E0.03，M0.02.发病前常参加水田劳动2.对确诊有意义的实验室检查是A.肥达反应B.外斐反应C.钩端螺旋体凝集溶解试验D.血清出血热IgM抗体E.胸部X线检查答案：C

试题点评：患者参加水田劳动，腓肠肌痛，浅表淋巴结肿大，考虑为钩

端螺旋体病，故选凝集试验。3.首选的治疗药物是A.青霉素GB.磺胺嘧啶C.吡喹酮D.阿苯达唑E.氟康唑答案：A4.病原治疗药物的应用原则是A.静脉滴注大剂量B.开始时肌注小剂量C.疗程2周以上D.每日只需用药1次E.退热后即可停药答案：B
试题点评：钩端螺旋体凝集溶解试验是钩体病的确诊实验，初始用青霉素G治疗剂量过大可引起赫氏反应。5.用青霉素治疗下列疾病的过程中，首剂肌注后可出现赫氏反应的是A.流脑B.猩红热C.钩体病D.白喉E.败血症答案：C6.诊断钩端螺旋体病的血清学检查方法为A.肥达试验B.外斐试验C.补体结合试验D.显微镜凝集溶解试验E.红细胞溶解试验答案：D
转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com