

2007年执业医师考试考点精析（内科）五十 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/239/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E6_89_A7_c22_239273.htm 第五十章 细菌感染第一节 伤寒

【考纲要求】1.病原学及流行病学：传染源、传播途径、人群易感性。2.病理解剖特点。3.临床表现：典型伤寒的四期临床表现及主要并发症。4.实验室检查：血象、培养及肥达氏实验在伤寒诊断中的意义。5.治疗原则：病原治疗。【考点纵览】1.明确伤寒流行病学特点。2.伤寒发病第三周坏死组织脱落形成溃疡易引起肠出血、肠穿孔。3.典型伤寒的四期临床表现及主要并发症：肠出血、肠穿孔。4.伤寒杆菌培养的临床意义。5.伤寒杆菌抗原抗体系统及诊断意义。6.伤寒治疗首选药物为喹诺酮类药物。【历年考题点津】1.男，22岁，民工，近4天来发热、头晕、头痛、食欲减退。体检皮肤有少量散在淡红色斑丘疹，脾于侧位肋下1cm.外斐反应，变形杆菌OX19凝集试验阳性。本例的诊断是A.伤寒B.地方性斑疹伤寒C.感冒D.流行性出血热E.猩红热答案：B试题点评：据外斐反应、变形杆菌OX19凝集试验阳性可初步诊断斑疹伤寒，因该患者斑丘疹较少，故考虑地方性斑疹伤寒。2.21岁，男性，持续发热，腹泻一周，2~3次/日，便中有粘液，右下腹隐痛，头疼、恶心，吐一次，伴食欲不振。体检：T39℃，神志清，表情淡漠，肝肋下2cm，脾肋下1cm，末梢血WBC $2.9 \times 10^9/L$ ，N 0.80，L 0.20，粪便常规检查WBC（+），RBC少许，未见虫卵，粪便培养无致病菌生长，此阶段该病例确诊最关键的检查为A.骨髓穿刺常规检查B.血培养致病菌C.肥达反应D.粪便检查阿米巴原虫E.粪便细菌培养答案：B试题点评

：被病人考虑为伤寒，病程1周时血培养阳性率可达90%，而血清中各种相应抗体的凝集效价一般自病程第2周始方逐渐增加，故此阶段应选B。

3.患者张某，疑似伤寒入院，两次取血做肥达反应的结果如下：入院后第四天结果，TH 1：80，TO 1：80，TA、TB、TC 1：40；入院后第十二天，TH、TO 1：320，TA、TB、TC 1：40，可诊断为A.伤寒B.甲型副伤寒C.乙型副伤寒D.沙门菌早期感染E.回忆反应

答案：A

试题点评：血清特异性，抗体阳性，肥达反应“O”抗体凝集效价 $\geq 1:80$ ；“H”抗体 $\geq 1:160$ ，恢复期增高4倍以上，即可确诊伤寒。

[医学教育网搜集整理]

4.伤寒患者最具有特征性的病理改变部位是在A.回肠末端B.升结肠C.乙状结肠D.肝、脾E.心、脑

答案：A

5.男性，5岁，持续发热15天，体温 $39 \sim 39.5$ ，伴腹泻每日3~5次。体检：神萎，心率72次/分，肝右肋下2cm，脾肋下1.5cm，血常规检查：WBC $3.0 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞60%，淋巴细胞40%，嗜酸粒细胞0，ALT 200U/L，血清抗-HBs阳性。该病例最可能的诊断是A.急性乙型肝炎B.伤寒C.钩端螺旋体病D.急性血吸虫病E.急性细菌性痢疾

答案：B

试题点评：稽留热，相对缓脉，肝脾肿大，血白细胞低均是伤寒的特点。

6.男性，16岁，发热10天伴食欲减退，软弱。体检，体温 39.6 ，脉搏74次/分，肝肋下2.0cm，脾肋下1.0cm。WBC $2.6 \times 10^9/L$ ；N 0.85，L 0.14，嗜酸粒细胞0.01，临床上拟诊为伤寒，为确定诊断对该患者应首选下列哪一种培养A.粪便培养B.血培养C.尿液培养D.胆汁培养E.肥达氏反应

答案：B

试题点评：血培养于病程1周时阳性率可达90%；尿培养及便培养第3~4周阳性率最高，肥达反应第2周起滴度才增加。（7~8题共用题干）

女性，30岁，持续发热10天，体温呈稽留热。

体检：精神萎靡，反应淡漠，体温39.5℃，心率76次/分，脉率70次/分，肝肋下1.5cm，脾肋下2cm，WBC $1.4 \times 10^9/L$ ，N 0.40，L 0.60，肥达反应O 1:80(+)，H 1:160(+)，ALT 180U/L，总胆红素22.2 $\mu\text{mol/L}$ ，HBsAg阴性。7.该病例最可能的诊断是A.急性黄疸性肝炎B.钩端螺旋体病C.伤寒合并中毒性肝炎D.病毒性肝炎合并胆道感染E.伤寒答案：C试题点评：患者为典型伤寒症状，于病程第1周后出现肝功异常，且HBsAg(-)，排除病毒性肝炎最常见的类型乙肝，因此考虑存在中毒性肝炎。8.为确定诊断应进行检查的项目是A.血培养B.甲肝病毒抗体C.戊肝病毒抗体D.丙肝病毒抗体E.粪便培养答案：A试题点评：见本章节第6题。9.一伤寒患者经治疗后体温渐降，但未降至正常，此后体温再次升高，血培养阳性，属于A.复发B.再燃C.重复感染D.混合感染E.再感染答案：B(10~13题共用题干)男性，22岁，既往有HBsAg阳性史。10天前无诱因发烧，体温逐渐上升，波动于37.5~39℃，近3天体温持续在38.5~39.5℃不降，伴有食欲不振、乏力、腹胀及尿黄。查体：T39.5℃，P 88次/分，BP110/70mmHg，神清，表情淡漠，未见皮疹，巩膜轻度黄染，心肺未见异常，腹软，右下腹压痛(+)，肝右肋下2cm，脾未触及，肝浊音区不小，移动性浊音阴性，双下肢无浮肿。化验：WBC $3.5 \times 10^9/L$ ，N 60%，L 40%，血HBsAg(+)，抗HAV-IgG(+)。10.该患者最可能的诊断是A.病毒性肝炎，乙型，慢性轻度B.病毒性肝炎，甲型，急性黄疸型，乙肝表面抗原携带者C.伤寒，病毒性肝炎，乙型，急性黄疸型D.伤寒，病毒性肝炎，甲型，亚急性重型E.伤寒，乙肝表面抗原携带者答案：E试题点评：IgG持续时间较长，不能据此抗体诊断甲肝。该病人有稽留

热，表情淡漠，右下腹压痛，白细胞减低，应考虑存在伤寒。因此应选E。11.为确诊该病例，首选的检查是A.肝功化验B.肝炎病毒血清学C.血培养D.肥达反应E.肝胆脾彩超答案：C12.病人治疗的首选方案是A.卧床休息，保肝治疗B.卧床休息避免用肝损伤药物，戒酒C.用激素退热，减轻中毒症状D.用喹诺酮类药物进行病原治疗E.用干扰素治疗答案：D试题点评：喹诺酮类药物为伤寒首选药物。13.该患者可能发生的严重并发症是A.心包炎B.急性胆囊炎C.肠出血、肠穿孔D.支气管肺炎E.肝昏迷答案：C试题点评：A、B、D、E均非伤寒并发症。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com