

中国药典2000版一部：仁青常觉 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/240/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c23_240447.htm

【摘要】仁青常觉属于2000版一部栏目，主要讲述了鉴别(1)取本品1g，研细，加甲醇20ml，超声处理30分钟，滤过，滤液浓缩至1ml，作为供试品溶液。另取西红花对照药材0.02g，同法制成对照药材溶液。再取盐酸小檗碱对照品，加甲醇制成每1ml含0.1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录B)试验，吸取上述三种溶液各10 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以醋酸乙酯-甲酸-水(5:1:0.8)为展开剂，展开，取出，晾干。供试品色谱中，在与西红花对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点；置紫外光灯(365nm)下检视，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的一个黄色荧光斑点。(2)取本品2g，研细，加丙酮20ml，超声处理30分钟，滤过，滤液浓缩至2ml，作为供试品溶液。另取胆酸、猪去氧胆酸对照品，加丙酮制成每1ml含0.2mg的混合溶液，作为对

照品溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取上述两种溶液各10 μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以氯仿 - 乙醚 - 冰醋酸(4:4:2) 为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸溶液，在105℃ 烘至斑点显色清晰，置紫外光灯(365nm) 下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的两个荧光斑点。检查 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 A）。功能与主治 清热、解毒、调和、“龙、赤巴、培根”，滋补。用于“龙、赤巴、培根”各病，陈旧性胃肠炎、溃疡，“木布”病，萎缩性胃炎，各种中毒症；自然毒、化学毒、矿物毒、梅毒、麻风、陈旧热病、炭疽、疔痛、利尿、干黄水、止血、生肌、内脏、化脓等。无病服用可滋补，抗衰老，防病。用法与用量 口服，重病一日1丸。一般三至七或十天服1丸。开水或酒泡，黎明空腹服用。服用前后三天忌食各类肉、酸性食物。注意 服药期间，禁用酸、腐、生冷食物，防止受凉，禁止房事。规格 每丸重1g 贮藏 密封。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com