

中国药典2000版一部：十香返生丸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/241/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c23\\_241269.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/241/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c23_241269.htm) 【摘要】

十香返生丸属于2000版一部栏目，主要讲述了(2)取本品6g，剪碎，加乙醚10ml，振摇提取15分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。

另取苏合香对照药材0.15g,加乙醚10ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录 B)试验，吸取供试品溶液10

$\mu\text{l}$ 、对照药材溶液3  $\mu\text{l}$ ，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶 G F 254 薄层板上，以石油醚(30~60 ) - 正己烷 - 甲酸乙...

...。本文重点关注ml 溶液 苏合香 对照 等内容，您可以在本页对十香返生丸进行讨论【关键字】2000版一

部.ml.溶液.苏合香.对照.十香返生丸【全文】中药名称十香返生丸拼音名Shixiang Fansheng Wan性状本品为深棕色的大蜜丸；气芳香，味甘、苦。鉴别(1)取本品，置显微镜下观察：无定形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。草酸钙针晶成束或散在，长25~75  $\mu\text{m}$ .含糊化多糖类物的组织碎片，遇碘液

显棕色或淡棕紫色。(2)取本品6g，剪碎，加乙醚10ml，振摇提取15分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取苏合香对照药材0.15g,加乙醚10ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录 B)试验，吸取供试品溶液10  $\mu\text{l}$ 、对照药材溶液3

$\mu\text{l}$ ，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶 G F 254 薄层板上，以石油醚(30~60 ) - 正己烷 - 甲酸乙酯 - 甲酸(10:30:15:1)为展开剂，在11~13 展开，取出，晾干，置紫外光灯(254nm)下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。(3)取本品10g,剪碎，加乙

醚10ml，振摇提取15分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取苏合香对照药材0.15g,加乙醚10ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录 B)试验，吸取供试品溶液10  $\mu\text{l}$ 、对照药材溶液3

$\mu\text{l}$ ，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶 G F 254 薄层板上，以石油醚(30~60 ) - 正己烷 - 甲酸乙酯 - 甲酸(10:30:15:1)为展开剂，在11~13 展开，取出，晾干，置紫外光灯(254nm)下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。(3)取本品10g,剪碎，加乙

醚10ml，振摇提取15分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取苏合香对照药材0.15g,加乙醚10ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录 B)试验，吸取供试品溶液10  $\mu\text{l}$ 、对照药材溶液3

$\mu\text{l}$ ，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶 G F 254 薄层板上，以石油醚(30~60 ) - 正己烷 - 甲酸乙酯 - 甲酸(10:30:15:1)为展开剂，在11~13 展开，取出，晾干，置紫外光灯(254nm)下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。(3)取本品10g,剪碎，加乙

醇50ml，置水浴上加热回流1小时，放冷，滤过，滤液作为供试品溶液。另取胆酸对照品，加乙醇制成每1ml含0.2mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取供试品溶液10 $\mu$ l、对照品溶液2 $\mu$ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以氯仿-乙醚-冰醋酸(2:2:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%磷钼酸乙醇溶液，在105 $^{\circ}$ C烘约10分钟。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

处方沉香 30g 丁香 30g 檀香 30g 青木香 30g 香附（醋炙）30g 降香 30g 广藿香 30g 乳香（醋炙）30g 天麻 30g 僵蚕（麸炒）30g 郁金 30g 莲子心 30g 瓜蒌子（蜜炙）30g 金礞石（煅）30g 诃子肉 30g 甘草 60g 苏合香 30g 安息香 30g 麝香 15g 冰片 7.5g 朱砂 30g 琥珀 30g 牛黄 15g

制法 以上二十三味，除朱砂水飞或粉碎成极细粉外，琥珀、安息香、麝香、冰片、牛黄分别研成细粉；苏合香炖化，滤过；其余沉香等十六味粉碎成细粉，过筛，混匀，与上述安息香等六味细粉配研，过筛，混匀，每100g粉末加炼蜜90~100g及苏合香制成大蜜丸，即得。检查应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 A）。功能与主治 开窍化痰，镇静安神。用于中风痰迷心窍引起：言语不清，神志昏迷，痰涎壅盛，牙关紧闭。用法与用量 口服，一次1丸，一日2次，或遵医嘱。注意 孕妇忌服。规格 每丸重6g 贮藏 密封。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)