

头孢菌素类抗生素：头孢替安 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/242/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E8_8F_8C_E7_c23_242263.htm 药物名称头孢替安
药物别名头孢噻乙胺唑，PANSPORIN英文名称Cefotiam说明
注射用二盐酸头孢替安：每瓶0.5g；1g。功用作用对革兰阳性菌的作用与头孢唑啉相接近，而对革兰阴性菌，如嗜血杆菌、大肠杆菌、克雷白杆菌、奇异变形杆菌等作用比较优良，对肠杆菌、枸橼酸杆菌、吲哚阳性变形杆菌等也有抗菌作用。本品口服不吸收，静注本品0.5g后，当时的血药浓度为65 $\mu\text{g}/\text{ml}$ ，半小时后为20 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 。肌注0.5g后半小时内血药浓度达高峰为20 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 。本药以原形自肾排泄， $t_{1/2}$ 约为0.5小时。在肠道中不吸收，内脏器官中药物浓度以肺中为较高，在其他内脏和肌肉组织中也有一定浓度。本品不易进入脑脊液中。临床上应用本品治疗敏感菌所致的感染如肺炎、支气管炎、胆道感染、腹膜炎、尿路感染，以及手术后或外伤引起的感染和败血症等。用法用量成人1日常用量为1~2g，分2~4次给予。严重感染，如败血症也可用至1日4g注意事项（1）偶可致过敏，必要时可用300 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 浓度的药液进行皮试。（2）肾功能不全者应减量并慎用。本品使用期间要进行尿液化验，如若损及肾功能，则应停药。（3）用药期间肝氨基转移酶可能有一时性升高，停药后可恢复。（4）可引起血象改变，严重时应立即停药。（5）本品可致肠道菌群改变，造成维生素B和K缺乏，偶也可致继发感染。一般胃肠道反应有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。（6）与氨基糖苷类抗生素联合应用，一般认为有协同作用，但可能加重肾损害

，同置于一个点滴器中可影响药物效价。（7）与呋塞米等强利尿剂合用可造成肾损害。（8）静注大量，可致血管疼痛和血栓性静脉炎，肌注时注意勿损及神经。（9）使用本品期间，应用碱性酒石酸铜试液进行尿糖试验时，可得假阳性反应，直接抗人球蛋白（Coombs）试验也可得假阳性反应。（多数的头孢菌素均有此反应）。（10）本品溶解后应立即应用，否则药液色泽会变深。 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com