

头孢菌素类抗生素：头孢呋辛钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/242/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E8_8F_8C_E7_c23_242264.htm 药物名称头孢呋辛钠 药物别名头孢呋肟，ZINACEF英文名称Cefuroxime Sodium 说明注射用头孢呋辛钠：每瓶0.75g；1.5g。功用作用对革兰阳性菌的抗菌作用低于或接近于第一代头孢菌素。革兰阴性的流感嗜血杆菌、淋球菌、脑膜炎球菌、大肠杆菌、克雷白杆菌、奇异变形杆菌、肠杆菌属、枸橼酸杆菌、沙门菌属、志贺菌属以及某些吲哚阳性变形杆菌对本品敏感。本品有较好的耐革兰阴性菌的β-内酰胺酶的性能，对上述菌中耐氨基青霉素或耐第一代头孢菌素的菌株也能有效。绿脓杆菌、弯曲杆菌、不动杆菌、沙雷杆菌大部分菌株、普通变形杆菌、难辨梭状芽胞杆菌、李司忒菌等对本品不敏感。肌注750mg，血药浓度达峰值时间约45分钟，平均浓度为27 μg/ml；静注750mg或1.5g，15分钟血药浓度分别为50 μg/ml或100 μg/ml，分别在5.3小时或8小时内维持2 μg/ml的有效浓度，t_{1/2}约80分钟。约有90%的药物在8小时内由肾排泄，尿药峰浓度可达1300 μg/ml。临床应用于敏感的革兰阴性菌所致的下呼吸道、泌尿系、皮肤和软组织、骨和关节、女生殖器部位的感染。对败血症、脑膜炎也有效。用法用量 肌注或静注，成人：1次750～1500mg，1日3次；对严重感染，可按1次1500mg，1日4次。应用于脑膜炎，1日剂量在9g以下。儿童：平均1日量为60mg/kg，严重感染可用到100mg/kg，分3～4次给予。肾功能不全者按患者的肌酐清除率制订给药方案：肌酐清除率>20ml/分者，每日3次，每次0.75～1.5g；10

~ 20ml / 分者每次0.75g，1日2次； < 10ml / 分者每次0.75g，1日1次。肌注：1次用0.75g，加注射用水3ml，振摇使成混悬液，用粗针头作深部肌注。静脉给药：每0.75g本品，用注射用水约10ml，使溶解成澄明溶液，缓慢静注或加到墨菲氏管中随输液滴入。注意事项（1）对青霉素过敏或过敏体质者慎用。（2）不良反应有皮肤瘙痒、胃肠道反应、血色素降低、血胆红素升高、肾功能改变等。肌注可致局部疼痛。

（3）不可与氨基糖苷类置同一容器中注射。（4）与高效利尿药（如速尿）联合应用，可致肾损害。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com