

中国药典2000版一部：明目地黄丸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/242/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c23_242350.htm

【摘要】明目地黄丸属于2000版一部栏目，主要讲述了中药名称明目地黄丸拼音名 Mingmu Dihuang Wan 性状 本品为黑褐色至黑色的水蜜丸、黑色的小蜜丸或大蜜丸。菌丝无色或淡棕色，直径4 ~ 6 μm 。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。种皮石细胞淡黄色，壁波状弯曲，胞腔含棕色物。。

本文重点关注明目地黄 ml 棕色 等内容，您可以在本页对明目地黄丸进行讨论【关键字】2000版一部.明目.地黄.ml.棕色.

明目地黄丸【全文】中药名称明目地黄丸拼音名 Mingmu Dihuang Wan 性状本品为黑褐色至黑色的水蜜丸、黑色的小蜜丸或大蜜丸；气微香，味先甜而后苦、涩。鉴别 (1) 取本品，置显微镜下观察：淀粉粒三角状卵形或矩圆形，直径24 ~ 40 μm ，脐点短缝状或人字状。不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径4 ~ 6 μm 。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。果皮表皮细胞橙黄色，表面观类多角形，垂周壁略连珠状增厚。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群。种皮石细胞淡黄色，壁波状弯曲，胞腔含棕色物。花粉粒类圆形，直径24 ~ 34 μm ，外壁有刺，长3 ~ 5 μm ，具3个萌发孔。纤维直径15 ~ 35 μm ，壁厚，微木化，有大的圆形纹孔。果皮纤维上下层纵横交错排列。不规则团块暗灰色，不透明，加酸发生气泡。(2) 取本品1g (或半丸)，捣碎，平铺于坩埚中，上盖一长柄漏斗，徐徐加热，至粉末微焦时，停止加热，放冷

，取下漏斗，用水5ml冲洗内壁，洗液置紫外光灯(365nm)下观察，显淡蓝绿色荧光。(3)取本品2g，置烧杯中，用水淘洗，于杯底可得少量灰白色沉淀，取出，加稀盐酸2滴，即煮沸，放出二氧化碳气体，气体遇氢氧化钙试液，即发生混浊；再加水2ml，搅拌，滤过，滤液用氨试液调至弱碱性，加草酸铵试液1滴，即生成白色沉淀。(4)取本品小蜜丸或大蜜丸24g(水蜜丸18g)，蜜丸切碎，水蜜丸研碎，加乙醚10ml使湿润，加石油醚(30~60℃)40ml，超声处理15分钟，静置过液，滤过，滤液挥干，残渣加丙酮2ml使溶解，作为供试品溶液。另取丹皮酚对照品，加丙酮制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录B)试验，吸取供试品溶液6μl、对照品溶液4μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以苯为展开剂，展开，取出，晾干，喷以盐酸酸性5%三氯化铁乙醇溶液，在105℃加热约5分钟。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

处方熟地黄160g 山茱萸(制)80g 牡丹皮60g 山药80g 茯苓60g 泽泻60g 枸杞子60g 菊花60g 当归60g 白芍60g 蒺藜60g 石决明(煅)80g 制法 以上十二味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g粉末加炼蜜35~50g与适量的水，泛丸，干燥；或加炼蜜90~110g制成小蜜丸或大蜜丸，即得。检查应符合丸剂项下有关的各项规定(附录A)。功能与主治 滋肾，养肝，明目。用于肝肾阴虚，目涩畏光，视物模糊，迎风流泪。用法与用量 口服，水蜜丸一次6g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2次。规格 大蜜丸每丸重9g 贮藏 密封。

转贴于：100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com