

酰胺醇类抗生素：棕榈氯霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/243/2021_2022__E9_85_B0_E8_83_BA_E9_86_87_E7_c23_243135.htm 药物名称棕榈氯霉素

药物别名无味氯霉素英文名称Chlo-ramphenicol Palmitate说明
棕榈氯霉素(B型)片50mg(按氯霉素计)。棕榈氯霉素(B型)颗粒剂：0.1g(按氯霉素计)。棕榈氯霉素混悬液：1ml：25mg(按氯霉素计) 功用作用口服无味，作用与氯霉素同 主要用于伤寒、副伤寒和其他沙门菌、脆弱拟杆菌感染。与氨苄西林合用于流感嗜血杆菌性脑膜炎。由脑膜炎球菌或肺炎链球菌引起的脑膜炎，在病人不宜用青霉素时，也可用本品。外用治疗沙眼或化脓菌感染。用法用量口服，按氯霉素计，1次0.25～0.5g，1日3～4次。小儿每日25～50mg/kg，分3～4次服 注意事项（1）主要不良反应有粒细胞及血小板减少、再生障碍性贫血等。皮疹、药物热、血管神经性水肿偶有发生。近年报道，本品尚能引起溶血性贫血、铁粒幼细胞贫血、球后视神经炎、循环呼吸骤停、速发性过敏反应及心肌损害等。溶血性贫血多在用药后数小时至2～3天发生，症状为发热，褐色尿、巩膜及皮肤黄染、脾肿大等。尚可发生剥脱性皮炎，但少见。（2）长期应用可能引起视神经炎、共济失调，以及由于菌群失调而致的维生素缺乏和二重感染等。（3）消化道反应有恶心、呕吐、食欲不振、舌炎、口腔炎等。（4）新生儿和早产儿应用本品可引起循环衰竭（灰婴综合征），应禁用。（5）精神病人用本品可引起严重失眠、幻视、幻觉、猜疑、狂躁、忧郁等精神症状，故禁用。（6）本品肌注常引起较剧烈的疼痛，还可致坐骨神经麻痹而造成下肢

瘫痪，故已少用。 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试
题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com