

中国药典2000版一部：片姜黄 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/243/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c23_243219.htm 【全文】中药名称片姜黄拼音名Pianjianghuang英文名RHIZOMA WENYUJIN CONCISA来源本品为姜科植物温郁金*Curcuma wenyujin* Y. H. Chen et C. Ling 的干燥根茎。冬季茎叶枯萎后采挖，洗净，除去须根，趁鲜纵切厚片，晒干。性状本品呈长圆形或不规则的片状，大小不一，长3~6cm，宽1~3cm，厚0.1~0.4cm。外皮灰黄色，粗糙皱缩，有时可见环节及须根痕。切面黄白色至棕黄色，有一圈环纹及多数筋脉小点。质脆而坚实。断面灰白色至棕黄色，略粉质。气香特异，味微苦而辛凉。鉴别(1) 本品横切面：表皮有残留，外壁稍厚。木栓细胞多列。皮层散有叶迹维管束；内皮层明显。中柱大，维管束外韧型，靠外侧的较小，排列紧密，有的木质部仅1~2个导管，中间较大，并伴有薄壁性纤维。皮层及中柱薄壁组织中散有油细胞；薄壁细胞含淀粉粒。(2) 取本品粉末0.5g，加石油醚5ml，振摇5分钟，滤过，取滤液滴于滤纸上，稍干，加香草醛试液1滴，即显樱红色。(3) 取本品粉末1g，切碎，加石油醚(30~60℃) 5ml，时时振摇，约30分钟，滤过，滤液加石油醚至5ml，作为供试品溶液。另取片姜黄对照药材1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录 B) 试验，吸取上述两种溶液各2μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚(30~60℃) - 醋酸乙酯(85:15) 为展开剂，展开，取出，晾干，喷以1%香草醛硫酸溶液，100℃加热数分钟至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显

相同颜色的斑点。性味与归经辛、苦，温。归肝、脾经。功能与主治破血行气，通经止痛。用于血滞经闭，行经腹痛，胸胁刺痛，风湿痹痛，肩臂疼痛，跌扑损伤。用法与用量3~9g。注意孕妇慎用。贮藏置阴凉干燥处，防蛀。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com