

临床执业医师《妇产科学》辅导：早期妊娠的诊断 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/244/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_8A\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_c22\\_244064.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/244/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_244064.htm) (一) 病史与症状 1. 停经 (cessation of menstruation) 生育年龄的已婚健康妇女，平时月经周期规律，一旦月经过期10日以上，应疑为妊娠。 2. 早孕反应在约有半数以上妇女在停经6周前后开始出现头晕、疲乏、嗜睡、食欲不振、偏食、厌恶油腻、恶心、晨起呕吐等，称早孕反应 (morning sickness)。 3. 尿频 由于妊娠早期增大的子宫，尤其是前位子宫，在盆腔内压迫膀胱及盆腔充血刺激所致尿频，一般孕12周后子宫上长升进入腹腔，尿频症状消失。(二) 体征 1. 生殖器官的变化 妊娠后阴道粘膜及宫颈充血小肿、变软呈紫蓝色。子宫体饱满，前后径增宽呈球形。由于子宫颈变软及子宫峡部极软，双合诊检查时，感觉宫颈与宫体似不相连，黑加征 (Hegar sign)。 2. 孕房的变化 早期时在雌激素的作用下，腺管发育及脂肪沉积。孕激素促进腺泡发育。(三) 辅助检查 1. 妊娠试验 (pregnancy test) 一般受精后7日即在血清中检测HGG.常用放射免疫法HGG-亚型若值 < 3为阴性， > 6为阳性。 2. 超声检查 (1) B型超声：是检查早孕和确定胎龄最快速、准确的方法，最早要在孕5周时作出早期诊断。阴道超声较腹部超声可提前5~7日确诊早期妊娠的超声图像： 妊娠囊 (gestational sac, GS)：妊娠最早标志。 卵黄囊：是子宫内妊娠的标志。(2) 超多普勒法：在增大的子宫区内可听到有节律的单一高调胎心音，胎心率一般在150~160bpm，最早可出现在妊娠7周时，还可以听到脐带杂音。 3. 宫颈粘液检查 取少量涂在

玻片上，干燥后光镜下可见到排列成行的椭圆体，无羊齿植物叶状结晶，早期妊娠可能性不大。4.基础体温（BBT）测定如BBT呈双相型，而体温升高持续18日不下降，早孕的可能性大；台果持续3周仍不下降，应考虑早孕。5.黄体酮试验（progesterone test）对可疑为早孕的妇女，可以每日肌注黄体酮20mg，边作3~5日，停药后2~7日出现阴道流血，查以排除妊娠。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)