

临床执业医师《妇产科学》辅导：中、晚期妊娠的诊断
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/244/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_244065.htm

(一) 症状及体征
经历早期妊娠的经过，逐渐感到腹部增大和觉胎动。
1. 子宫增大 子宫随妊娠进展逐渐增大，根据手测宫底高及尺测耻上子宫长度，可以判断妊娠周数。
2. 胎动 胎儿在子宫内的活动称胎动 (fetal movement, FM)，是妊娠诊断依据，也是胎儿宫内安危的重要指标。若胎动 30次/12小时或4次/小时为正常；若连续2日胎动 3次/小时，则为异常。
3. 胎儿心音 于妊娠10周应用Doppler可听到胎心音，18~20周用听诊器经孕妇腹壁能听到胎心音。正常胎心率在120~160bpm，
< 120bpm或 > 160bpm表示胎心率异常。
4. 胎体 于妊娠20周以后，经腹壁可触到子宫内的胎体。
(二) 辅助检查
1. 超声检查 一般在妊娠18~20周应作胎儿畸形筛选超声。
2. 胎儿心电图 胎儿心电图 (fetal electrocardiography, FECG) 可反应胎儿心脏的活动情况。
转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com