

临床执业医师《儿科学》辅导：法洛氏三联症典型症状
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/244/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_244220.htm

典型的法洛氏三联症有以下症状。 1.紫绀：是法洛氏三联症的主要症状，大都在出生后3-6个月出现，但也有儿童和成人时期才出现紫绀。紫绀在运动和哭闹时加重，平静时减轻。 2.呼吸困难和活动耐力差：多在出生后6个月开始出现，有时产生紫绀加重和缺氧发作，常发生在婴幼儿时期，其特点是呼吸困难、紫绀加重、昏厥、有时甚至昏迷和抽搐致命。由于缺氧，体力与活动耐力都较同龄儿童差，因此，法洛氏三联症的患儿多举止缓慢，不喜喧嚷而爱好静，不能或不愿与其他儿童一起玩耍。 3.蹲踞：是法洛氏三联症的特征性姿态，多见于小儿，因蹲踞时紫绀和呼吸困难减轻，可防止缺氧发作。转贴于：
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com