

中国药典2000版一部：益母草流浸膏 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/244/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c23_244103.htm 【全文】

中药名称益母草流浸膏拼音名Yimucao Liujingao英文名EXTRACTUM LEONURI LIQUIDUM性状本品为棕褐色的液体；味微苦。鉴别取本品5ml,加无水乙醇10ml，搅匀，滤过，滤液加活性炭约0.5g，置水浴上加热回流10分钟，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加酸性无水乙醇（无水乙醇 盐酸 = 9:1）0.5ml使溶解，作为供试品溶液。另取盐酸水苏碱对照品，加无水乙醇制成每含2mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取供试品溶液4~6 μ l、对照品溶液2 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丁醇 - 盐酸 - 水(8:2:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以改良碘化铋钾试液。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。处方益母草 1000g 乙醇适量制法取益母草，切碎，加水煎煮三次，合并煎液，滤过，滤液浓缩至约500ml，放冷，加入等量的乙醇，搅匀，静置，沉淀，滤过，滤渣用45%乙醇洗涤，洗液与滤液合并，减压回收乙醇，放冷，滤过，调整乙醇量使符合规定并使总体积为1000ml，静置，俟澄清，滤过，即得。检查乙醇量应为16~20%（附录 M）。总固体精密量取本品澄清液5ml,置称定重量的蒸发皿中，于水浴上蒸干，在105 $^{\circ}$ C干燥至恒重，遗留残渣不得少于0.375g。其他应符合流浸膏剂与浸膏剂项下有关的各项规定（附录 O）。功能与主治子宫收缩药。用于调经及产后子宫出血，子宫复原不全等。用法与用量口服，一次5~10ml，一日15~30ml

。注意孕妇禁用。贮藏密封。转贴于：100Test 下载频道开通
，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com