

抗肿瘤药：烷化剂抗肿瘤药尼莫司汀 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/248/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_248164.htm 药物名称 尼莫司汀
药物别名 尼氮芥，嘧啶亚硝脒，宁得朗，NIDRAN，ACNU
英文名称 Nimustine 说明 注射用尼莫司汀：每支25mg；50mg。
功用作用 临床适应证：临床上用于肺癌、胃癌、直肠癌、食管癌和恶性淋巴瘤等，可与其他抗肿瘤药物合并使用。
用法用量 每次剂量为2~3mg/kg或90~100mg/m²，以注射用水溶解（5mg/ml），缓慢静注或静滴。6周后可重复使用，总剂量300~500mg。本品还可用于胸腹腔注射、动脉注射和膀胱内给药。
注意事项 副作用有食欲不振、恶心、呕吐、乏力、发热、皮疹、脱发，对肝功能有一定影响（用药后1~3周氨基转换酶可升高，2~3周后自然恢复），并有迟缓性骨髓抑制。治疗中应观察血象变化以决定用药量。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com