

抗肿瘤药：烷化剂抗肿瘤药司莫司汀 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/248/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_248165.htm 药物名称 司莫司汀药物别名 甲环亚硝脲，甲基-CCNU，me-CCNU英文名称 甲环亚硝脲，甲基-CCNU，me-CCNU说明 胶囊剂：每胶囊10mg；50mg。功用作用 临床适应证：与BCNU及CCNU相同，对黑色素瘤、恶性淋巴瘤、脑瘤、肺癌等有较好的疗效。和氟尿嘧啶并用，对直肠癌、胃癌和肝癌均有效。我国学者试用于各类晚期恶性肿瘤306例，总有效率31.5%，有效病种与国外者相同。用法用量 口服，1次100～200mg/m²，每6～8周给药1次；也可36mg/m²，每周1次，6周为1疗程。合并其他药物时可给75～150mg/m²，6周给药1次；或30mg/m²，每周1次，连给6周。注意事项 与BCNU、CCNU一样，对骨髓、消化道及肝肾有毒性。口服后最早在45分钟可出现恶心、呕吐，迟者到6小时出现，通常在次日可消失。如在服药前给予止呕剂，或将服药时间改在睡前，均可减轻消化道反应。血小板减少低谷出现在服药后4周左右，白细胞减少的低谷出现在5～6周，持续6～10天。其他如口腔炎、脱发、肝功损伤均是轻度。3种亚硝脲类药物的中等毒性剂量为：本品225mg/m²相当于BCNU250mg/m²，CCNU130mg/m²。用药期间应定期检查血象。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com