

抗肿瘤药：烷化剂抗肿瘤药阿糖胞苷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/248/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_248213.htm 药物名称 阿糖胞苷药物别名 Cytosine Arabinoside) , CYTOSAR , ARA-C英文名称 Cytarabine说明 注射用阿糖胞苷：每安瓿50mg；100mg。功用 作用 Ara-C主要治疗急性白血病及消化道癌，对多数实体肿瘤无效。眼部带状疱疹、单纯疱疹性结膜炎也有一定疗效。用法用量 静脉注射，1次1~2mg / kg，每日1次，连用10~14天为一疗程。或4~6mg / kg，每周2次。也可静脉滴注，每日5~7.5mg / kg，点滴8~12小时，连用4~5天。皮下注射，多用于维持治疗，每次1~3mg / kg，每周1~2次。鞘内注射，每次25~75mg溶于生理盐水5~10ml中，隔日1次，共次。预防脑膜白血病，每6周注射1次。注意事项 骨髓抑制、消化道反应常见，少数病人可有肝功异常、发热、皮疹。用药期间应严格检查血象。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com