

抗肿瘤药:烷化剂抗肿瘤药安吡啶 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/248/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_97\\_E8\\_82\\_BF\\_E7\\_98\\_A4\\_E8\\_c23\\_248252.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/248/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_248252.htm) 药物名称 安吡啶药物别名 英文名称 Amsacrine说明 注射剂：1.5ml：75mg。功用作用 成人急性白血病、乳腺癌。本品对急性白血病的各种类型均有较好的治疗效果，在病人已对蒽环类化合物（如柔红霉素）或阿糖胞苷等产生抗药性后，本品仍可产生较好疗效。用法用量 静滴：诱导剂量每日75mg～125mg/m<sup>2</sup>，每5日为一疗程，每疗程间隔3周～4周。维持剂量为上述剂量的1/2，可每隔4周～8周重复1次。注意事项 禁用于骨髓抑制患者。（1）本品遇氯离子易发生沉淀，全部输注过程中应避免与等渗盐水或其它含氯离子的器皿、溶液接触；（2）本品未经稀释前应避免接触塑料制品，包括注射器，最好用玻璃注射器吸药；（3）本品未稀释前应避免与皮肤或粘膜直接接触，以免可能发生的组织刺激性；（4）本品必须在有经验的医师指导和严密观察下使用。用药期间应每日查白细胞总数及其分类，必要时应查骨髓像；（5）肝肾功能不良时慎用，或需要调整剂量。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)