

抗肿瘤药:抗生素类抗肿瘤药吡喃阿霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/248/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_248309.htm 药物名称 吡喃阿霉素
药物别名 吡柔比星，THP-ADM英文名称 Perarubicin说明注射用吡喃阿霉素：每支10mg；20mg，内含乳糖90mg、180mg。功用作用 对头颈部癌、乳腺癌、膀胱癌、输尿管癌、肾盂癌、卵巢癌、宫颈癌、恶性淋巴瘤和急性白血病有效，单药有效率为20%~30%，恶性淋巴瘤为50%。动脉给药和膀胱内给药的疗效则明显提高。用法用量 THP以5%葡萄糖注射液或蒸馏水10ml溶液溶解。剂量与用法：25~40mg/m²/次，静脉冲入，3~4周重复；7~20mg/m²/次，静脉冲入，1日1次，连用5天，3~4周重复；每次15~30mg/15~30ml溶液，膀胱内注入，保留1~2小时，每周3次，2~3周为1疗程。注意事项 毒副作用为骨髓抑制，表现为白细胞减少和血小板减少，食欲不振、恶心、呕吐、口腔炎、乏力、发热，少数有腹泻、肝肾功能损伤。脱发、心脏毒性和胃肠道反应较ADM为轻。静脉注射时药液漏至皮下，可引起局部炎症。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com