

抗肿瘤药:抗生素类抗肿瘤药阿克那霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/248/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_248314.htm 药物名称 阿克那霉素

药物别名 阿克那霉素 Aclacinomycin英文名称 说明 功用作用 急性白血病、恶性淋巴瘤、胃癌、肺癌、乳腺癌和卵巢癌等 用法用量 使用前用生理盐水或5%葡萄糖注射液溶解。 1 实体瘤和恶性淋巴瘤推荐剂量 40mg ~ 50mg(0.8mg ~ 1.0mg/kg)，2次/周，分别在1、2或1、4两日，可直接静脉注射或静滴。

20mg(0.4mg/kg)静注，1次/日，共7日，每隔1周重复给药，可直接静脉注射或静滴。 2 急性白血病推荐剂量

20mg(0.4mg/kg)静注，1次/日，每疗程10 ~ 15日，可直接静注或静滴。 注意事项 1 有心脏毒性，可出现心律失常。 2 骨髓抑制。 3 胃肠道反应。 4 肝、肾功能损害。 100Test 下载频道

开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com