

解热镇痛药:解热止痛药氨A非咖片 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/248/2021\\_2022\\_\\_E8\\_A7\\_A3\\_E7\\_83\\_AD\\_E9\\_95\\_87\\_E7\\_c23\\_248336.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/248/2021_2022__E8_A7_A3_E7_83_AD_E9_95_87_E7_c23_248336.htm) 药物名称 氨A非咖片

药物别名 英文名称 Compound minopyrine , Phenacetin and Caffeine Tablets说明 本品为白色片。功用作用 为一复方解热镇痛药。其中氨基比林和非那西丁均具有解热镇痛作用，能抑制下视丘前列腺素的合成和释放，恢复体温调节中枢感受神经元的正常反应性而起退热作用；同时还通过抑制前列腺素等的合成发挥镇痛作用。氨基比林并能抑制炎症局部组织中前列腺素的合成和释放，稳定溶酶体酶，影响吞噬细胞的吞噬作用而起到抗炎作用。咖啡因为中枢神经兴奋药，能兴奋大脑皮层，提高对外界的感应性，并有收缩脑血管，加强前两药缓解头痛的效果。发热及轻、中度的疼痛。用法用量 需要时服用一次12片，一日13次。[药物过量]本品应避免过量服用，过量服用可引起中枢神经、肝肾功能、血液系统等损害，一旦发生即应就医。注意事项 严重肝肾功能不全，溶血性贫血及对氨基比林、非那西丁或咖啡因类药物过敏者禁用。（1）本品长期服用可导致肾脏损害，严重者可致肾乳头坏死或尿毒症，甚至可能诱发肾盂癌和膀胱癌。（2）氨基比林在胃酸下与食物发生作用，可形成致癌性亚硝基化合物，特别是亚硝胺，因此有潜在致癌性。（3）不宜长久使用，以免发生中性粒细胞缺乏，用药超过1周要定期检查血象。（4）长期服用可造成依赖性，并产生耐受。（5）对各种创伤性剧痛和内脏平滑肌绞痛无效。[孕妇及哺乳期妇女用药]不推荐使用。[儿童用药]学龄前儿童不宜服用。[老年患

者用药]老年患者由于肝肾功能下降，服用本品易出现毒性反应，应慎用或适当减量使用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)