

解热镇痛药:解热止痛药保泰松 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/248/2021_2022__E8_A7_A3_E7_83_AD_E9_95_87_E7_c23_248341.htm 药物名称 保泰松药物别名 布他唑立丁，布他酮，BUTAZOLIDIN，BUTADION英文名称 Phenylbutazone说明片（胶囊）剂：每（胶囊）片0.1g；200mg。栓剂：25mg；注射液600mg（3ml）。功用作用作用类似氨基比林。但解热镇痛作用较弱，而抗炎作用较强，对炎性疼痛效果较好。有促进尿酸排泄作用。口服吸收完全， V_d 120ml/kg，增加剂量时 V_d 增大，但血浓度不增加，故重复使用时其稳态血浓度不呈线性增加。 $t_{1/2}$ 为56~86小时。本品肝内代谢，代谢产物（Oxyphenbutazone）仍有活性。用于类风湿性关节炎，风湿性关节炎及痛风。常需连续给药或与其它药交互配合使用。亦用于丝虫病急性淋巴管炎。用法用量（1）关节炎开始1日量0.3~0.6g，分3次服，饭后。1日量不宜超过0.8g。1周后如无不良反应，可继续服用并递减至维持量每日0.1~0.2g。（2）丝虫病急性淋巴管炎 每次服0.2g，1日3次，总量1.2~3g，急性炎症控制后，再用抗丝虫病药治疗。注意事项（1）本品副作用发生率约10%~20%，如短程使用发生较少。（2）对胃肠刺激性较大，可出现恶心、呕吐、腹痛、便秘等，如用时过长，剂量过大可致消化道溃疡。（3）可抑制骨髓引起粒细胞减少、甚至再生障碍性贫血，但如及时停药可避免。如连用1周无效者不宜再用，用药超过1周者应定期检查血象。（4）能使钠、氯离子在体内潴留而引起水肿。高血压、水肿、心衰病人禁用，用药期间应限制食盐摄入量。（5）可引起黄疸及肝炎。（6）与双香

豆素类抗凝血药、磺胺类、口服降血糖药合用，可引起它们血浓度增加而产生毒性。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com