

解热镇痛药:解热止痛药安乃近〔典〕 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/248/2021_2022__E8_A7_A3_E7_83_AD_E9_95_87_E7_c23_248344.htm 药物名称 安乃近〔典〕

药物别名 诺瓦经，罗瓦尔精，Analgin，Noramidopyrine，NOVALGIN英文名称 Metamizole Sodium说明片剂：每片0.25g；0.5g。注射液：每支0.25g（1ml）；0.5g（2ml）。滴鼻剂：10%～20%。功用作用 解热作用显著，镇痛作用较强，作用出现快。主要用于退热，亦用于急性关节炎、头痛、风湿性痛、牙痛及肌肉痛等。用法用量 口服：一次0.25～0.5g，一日0.75～1.25g。滴鼻：小儿退热常以10%～20%溶液滴鼻，5岁以下，每次每侧鼻孔1～2滴，必要时重复用1次；5岁以上适当加量。深部肌肉注射：每次0.25～0.5g；小儿每次5～10mg/kg。注意事项（1）本品较易引起不良反应，尤不宜用穴位注射，特别禁用关节部位穴位。（2）对药物过敏者（如对吡唑酮类药物）不宜用，不得与任何其它药物混合注射。（3）注射局部可产生红肿、疼痛，数天后可消退。有的病人呈毒血症症状，皮下出血点，或有紫黑色脓液，常需数月后痊愈。（4）较长时间使用可引起粒细胞减少，血小板减少性紫癜，严重者可有再生障碍性贫血甚导致死亡者。（5）可出现过敏性皮疹或药热、荨麻疹、严重者可有剥脱性皮炎、大疱性表皮松懈症导致死亡。（6）应严格控制剂量，成人每次不得超过0.5g，小儿每次以8～10mg/kg为宜。个别病人由于对本品过敏，可产生休克甚至突然死亡。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com