

中国药典2000版一部：益母草膏 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/248/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c23\\_248837.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/248/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c23_248837.htm) 【全文】中药名称益母草膏拼音名Yimucao Gao英文名EXTRACTUM LEONURI INSPISSATUM来源本品为益母草制成的煎膏。性状本品为棕黑色稠厚的半流体；气微，味苦、甜。鉴别取本品15g，加硅藻土4～4.5g，搅拌均匀，加盐酸乙醇溶液(0.5 100)50ml，振摇5分钟，放置过夜，滤过，滤液置水浴上浓缩成稠膏状，再加盐酸乙醇溶液(0.5 100)25ml，重复操作至浓缩成稠膏状，加0.1mol/L盐酸溶液10ml，搅拌均匀，滤过。取滤液1ml，加硅钨酸试液1～2滴，即生成白色沉淀；另取滤液1ml，加碘化铋钾试液2～3滴，即生成橙红色沉淀。制法取益母草，切碎，加水煎煮二次，每次2小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成相对密度为1.21～1.25(80～85℃)的清膏。每100g清膏加红糖200g，加热溶化，混匀，浓缩至规定的相对密度，即得。检查相对密度取本品10g，加水20ml稀释后，依法测定(附录A)，应为1.10～1.12。其他应符合煎膏剂项下有关的各项规定(附录F)。功能与主治活血调经。用于经闭，痛经及产后瘀血腹痛。用法与用量口服，一次10g，一日1～2次。注意孕妇禁用。贮藏密闭，置阴凉处。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)