

中国药典2000版一部：枳术丸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/248/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c23_248985.htm 【全文】中药名称枳术丸拼音名Zhizhu Wan性状本品为褐色的水丸；气微香，味微苦。鉴别(1)取本品，置显微镜下观察：草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。草酸钙针晶细小，不规则地充塞于薄壁细胞中。(2)取本品3g，研碎，加乙醚30ml，置水浴上回流1小时，滤过，滤液蒸干，残渣加醋酸乙酯1ml使溶解，作为供试品溶液。另取白术对照药材1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取上述两种新制备的溶液各1 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚（60～90）-醋酸乙酯(50:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%香草醛硫酸溶液，热风吹至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。(3)取本品3g，研碎，加甲醇20ml，置水浴上加热回流1小时，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇5ml使溶解，滤过，滤液作为供试品溶液。另取枳实对照药材1g，同法制成对照药材溶液。再取辛弗林对照品，加乙醇制成每1ml含2mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取上述三种溶液各2 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以氯仿-丙酮-甲醇-浓氨试液(13:4:3:0.5)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以0.5%茚三酮乙醇溶液，在105 $^{\circ}$ C烘约10分钟。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的桃红色斑点；在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。处方枳实（炒）250g 白术（炒）500g制法 以上二味，

粉碎成细粉，过筛，混匀。另取荷叶 75g，加水煎煮，滤过，用煎出液泛丸，干燥，即得。检查应符合丸剂项下有关的规定（附录 A）。功能与主治 健脾消食，行气化湿。用于脾胃虚弱，食少不化，脘腹痞满。用法与用量 口服，一次 6g，一日 2 次。贮藏 密闭，防潮。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com