

中国药典2000版一部：枳实导滞丸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/248/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c23_248986.htm 【全文】中药名称枳实导滞丸拼音名Zhishi Daozhi Wan性状本品为浅褐色至深褐色的水丸；气微香，味苦。鉴别(2)项下的甲醇提取液，作为供试品溶液。另取黄连对照药材10mg，加甲醇10ml，置水浴上加热回流15分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为对照药材溶液。再取盐酸小檗碱对照品，加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录VIB）试验，吸取供试品溶液5 μ l、对照药材及对照品溶液各2 μ l，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶G薄层板上，以正丁醇—冰醋酸—水(7:1:2)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的黄色荧光斑点；在与对照品色谱相应的位置上，显相同的一个黄色荧光斑点。处方枳实（炒）100g 大黄 200g 黄连（姜汁炒）60g 黄芩 60g 六神曲（炒）100g 白术（炒）100g 茯苓 60g 泽泻 40g制法以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀。用水泛丸，干燥，即得。检查应符合丸剂项下有关的各项规定（附录IA）。含量测定取本品粉末（通过三号筛）约0.5g，精密称定，置索氏提取器中，加甲醇10ml，置水浴中加热回流4小时，趁热滤过至100ml量瓶中，用少量甲醇洗涤容器，洗液与滤液合并，加甲醇至刻度，摇匀，精密量取5ml，置25ml量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另取橙皮甙对照品，加甲醇制成每1ml含0.05mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱

法（附录VI B）试验，吸取供试品溶液5 μ l、对照品溶液2 μ l与5 μ l，分别点于同一聚酰胺薄膜上，以甲醇为展开剂，展开，展距约3cm，取出，晾干，喷以1%三氯化铝的甲醇溶液，放置3小时，在紫外光灯(365nm)下定位，照薄层色谱法（附录VI B薄层扫描法）进行荧光扫描。激发波长 $\lambda = 330\text{nm}$ ，线性扫描，测量供试品与对照品荧光强度的积分值，计算，即得。本品按干燥品计算，含枳实以橙实以橙皮甙

（C₂₈H₃₄O₁₅）计不得少于2.0%。功能与主治 消积导滞，清利湿热。用于脘腹胀痛，不思饮食，大便秘结，痢疾里急后重。用法与用量 口服，一次6～9g，一日2次。贮藏 密闭，防潮。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com