

中国药典2000版一部：止痛紫金丸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/248/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c23\\_248992.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/248/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c23_248992.htm) 【全文】

中药名称止痛紫金丸拼音名Zhitong Zijin Wan性状本品为黑褐色的大蜜丸；气微腥，味苦涩。鉴别(1)取本品约3g，剪碎，置试管中，加稀盐酸10ml，在试管口盖一醋酸铅试纸，试管置水浴中加热5分钟，产生臭气，醋酸铅试纸渐变为棕色。滤过，滤液加亚铁氰化钾试液，生成蓝色沉淀，再加氢氧化钠试液，沉淀即由蓝色变为棕色。(2)取本品2g，剪碎，加25%硫酸溶液10ml，水解1小时，放冷，加氯仿15ml，置水浴上继续回流30分钟，分取氯仿层，蒸干，加甲醇2ml使溶解，滤过，滤液作为供试品溶液。另取大黄对照药材0.6g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录 B)试验，吸取上述两种溶液各5 $\mu$ l，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶G薄层板上，以苯-醋酸乙酯-甲酸-甲醇-水(30:10:0.5:2:5)的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的橙色荧光斑点；置氨气中熏后，斑点变为红色。处方丁香50g 血竭50g 当归50g 熟大黄50g 儿茶50g 红花50g 骨碎补(烫)50g 土虫25g 乳香(制)25g 没药(制)25g 赤芍25g 木香50g 自然铜(煅)25g 甘草25g 制法以上十四味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g粉末加炼蜜30~90g制成大蜜丸，即得。检查应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 A)。功能与主治舒筋活血，消瘀止痛。用于闪腰岔气，瘀血作痛，筋骨疼痛。用法与用量口服，一

次 1丸，一日2次。注意 孕妇忌服。规格每丸重6g贮藏密封。  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)