

2007年执业医师考试模拟试题及答案解析：妇科学3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/250/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E6_89_A7_c22_250227.htm 一、以下每一道题下面有A、B

、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。 1.

下述产程时间哪项不正确 A.初产妇第一产程约需11~12小时 B.初产妇第二产程约需1~2小时 C.第三产程不超过15分钟 D.经产妇第二产程超过1小时为延长 E.总产程超过28小时为滞产

答案：C 题解：分娩全过程是从规律宫缩开始至胎儿胎盘娩出为止，简称总产程。临床上分为三个产程。第一产程（宫颈扩张期）从规律宫缩开始，到宫口开全。初产妇需11~12小时，经产妇需6~8小时。第二产程（胎儿娩出期）从宫口开全到胎儿娩出。初产妇需1~2小时，经产妇一般数分钟到1小时。第三产程（胎盘娩出期）从胎儿娩出到胎盘娩出。需5~15分钟，不超过30分钟。初产妇第二产程>2小时，经产妇>1小时为第二产程延长；第二产程>1小时而胎头下降无进展为第二产程停滞。总产程超过28小时为滞产。 2.

临产后期主要作用的产力是指 A.子宫收缩力 B.腹肌收缩力 C.肛提肌收缩力 D.圆韧带收缩力 E.腹肌及膈肌收缩力 答案：A

题解：产力是将胎儿及其附属物从子宫内逼出的力量。包括子宫收缩力、腹肌和膈肌收缩力、肛提肌收缩力。子宫收缩力（简称宫缩）是临产后的主要产力。 3.

25岁初产妇孕足月，1年前有流产史，胎儿顺利娩出4分钟后，出现阴道暗红色间歇流血，约100ml，首先应考虑的原因是 A.颈管裂伤 B.阴道静脉破裂 C.血凝障碍 D.胎盘嵌顿 E.正常位置胎盘剥离 本

题正确答案：E 题解：时间和征象符合正常胎盘剥离征象：胎儿娩出5~15min内，胎盘剥离征象为：子宫体变硬呈球形，宫底升高达脐上；阴道少量出血；因剥离的胎盘降至子宫下段，阴道口外露的一段脐带自行延长 用手掌尺侧在产妇尺骨联合上方轻压子宫下段时，子宫体上升而外露的脐带不再回缩。

4. 胎儿娩出10分钟，阴道出血200ml，应如何处理 A.牵拉脐带 B.按摩子宫 C.快速娩出胎盘 D.检查会阴伤口 E.肌肉注射宫缩剂 答案：C 题解：胎儿娩出10分钟，阴道少量出血，为胎盘剥离征象。胎盘未剥离之前，切忌用手按揉下压子宫底或牵拉脐带，以免引起胎盘剥离不全而出血、脐带断裂及子宫内翻。当确定胎盘已完全剥离时，接生者协助胎盘胎膜完整出。胎盘胎膜娩出后，可按摩子宫刺激其收缩，以减少出血。

5. 初产妇枕先露时，宫口开全后开始保护会阴的时间应是 A.宫口开全即可 B.可以见到胎头时 C.胎头拨露使阴唇后联合紧张时 D.胎头着冠时 E.胎头复位时 答案：C 题解：当胎头拨露使阴唇后联合紧张时，应开始保护会阴。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com