

2007年执业医师模拟试题及答案解析：儿科学8 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/250/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E6_89_A7_c22_250232.htm 一、以下每一道题下面有A、B

、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。 1.

下列哪项不符合小儿原发性肺结核表现 A.上肺叶有空洞形成 B.肺门淋巴结肿大 C.对结核菌高度过敏 D.消瘦，盗汗和食欲减退 E.可见疱疹性角膜结膜炎 本题正确答案：A 题解：起病缓慢，症状多不明显。但当支气管淋巴结明显肿大，压迫支气管分叉处，可出现百日咳样痉挛性咳嗽；压迫支气管使其部分阻塞时引起喘鸣，有时产生肺气肿；完全阻塞可导致肺不张。 2.

确诊结核性脑膜炎最可靠的依据是 A.脑脊液生化有结核性脑膜炎的典型改变 B.颅神经瘫痪 结核接触史 C.昏迷 结核菌素试验阳性 D.脑脊液中查见结核分枝杆菌 E.脑脊液压力明显增高 本题正确答案：D 题解：脑脊液检查是决定诊断的重要检查措施，脑脊液压力增高，外观无色透明或呈毛玻璃样，白细胞多，分类以淋巴细胞占多数。蛋白定性阳性、糖和氯化物同时减少。将脑脊液静置12~24小时后，可见网状薄膜形成。可发现抗酸染色杆菌。 3.

结核病预防性化疗的疗程是 A.3个 B.6个月 C.12个月 D.18个月 E.24个月 本题正确答案：B 题解：对于以下情况，应进行预防性治疗

： 密切接触开放性结核病人的婴幼儿，不论结核菌素试验是阳性或是阴性； 3岁以下婴幼儿未接种过卡介苗而结核菌素试验为阳性者； 结核菌素试验最近由阴性转为阳性的小儿； 结核菌素试验呈强阳性的小儿； 有早期结核菌中毒

症状，结核菌素试验阳性而X线阴性的小儿；结核菌素试验阳性小儿，因其它疾病而需要用激素治疗者；结核菌素试验阳性小儿，新患麻疹或百日咳等。预防性治疗选用异烟肼，每日10mg/kg，每日1次。最大剂量每日不超过300mg，疗程6个月。

4. 小儿初次感染结核分枝杆菌至产生变态反应的时间是 A.48~72小时 B.2~3周 C.4~8周 D.10~12周 E.3~4个月
本题正确答案：C
题解：小儿初次与结核杆菌接触后，有普遍的易感性，但受感染后不一定都发病，这与感染结核杆菌数量的多少、毒力大小以及小儿抵抗力的强弱有关。机体初次感染结核杆菌4~8周后，产生迟发型变态反应，同时获得一定的免疫力。接种卡介苗后，小儿可产生免疫力，同时结核菌素反应亦由阴性转为阳性。

5. 结核菌素试验结果判定的观察时间是 A.4~8周 B.1周 C.48~72小时 D.24小时 E.20分钟
题正确答案：C
题解：结核菌素试验是用结核菌的菌体蛋白来测定机体对结核杆菌有无过敏反应，从而了解受试者是否曾被结核杆菌感染。结核菌素反应的局部炎症，属迟发型超敏反应。48~72小时看结果，以72小时为准检查反应，阳性反应者注射局部可有红晕、硬结形成，以测硬结的直径为准判断反应结果。

6. 结核菌素试验72小时，注射局部出现水泡和坏死，其范围为直径9mm，判断结果为 A.(-) B.(+) C.(++) D.(+++) E.(++++)
本题正确答案：E
题解：结核菌素试验结果的判定如下：红肿硬结直径(cm) 2.0，()强阳性。除硬结外，出现局部坏死或水泡，()强阳性。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com