

2007年执业医师模拟试题及答案解析：儿科学4 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/250/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E6_89_A7_c22_250241.htm 一、以下每一道题下面有A、B

、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。 1. 9

个月小儿，咳嗽流涕2天，发热半日，体温39℃，惊厥1次，5分钟后自行缓解。查体：神志清，前囟平坦，肺呼吸音清，无脑膜刺激征。白细胞 $6.5 \times 10^9/L$ ，血钙 2.24mmol/L 。最可能的诊断是

A.上感，高热惊厥 B.肺炎，中毒性脑病 C.肺炎，维生素D缺乏伴手足搐搦症 D.化脓性脑膜炎 E.肺炎，高热惊厥 本题正确答案：A 题解：高热惊厥好发年龄为6个月~3岁

，上感引起者占60%；常在病初体温急剧升高时发生，体温常达 $39 \sim 40^\circ\text{C}$ 以上；全身性抽搐伴有意识障碍，但惊止后，意识很快恢复；一般只发作1次，抽搐时间短暂，数秒至数分钟，一般不超过5~10分钟；神经系统检查为阴性，脑脊液检查除压力增高，无异常发现。根据以上特点可做出诊断。 2.

小儿肺炎早期由于喘憋，最容易引起 SaO_2 ， PaO_2 降低， PaCO_2 明显增高的是： A.支原体肺炎 B.呼吸道合胞病毒肺炎 C.金黄色葡萄球菌肺炎 D.肺炎链球菌肺炎 E.衣原体肺炎 本题正确答案：B 题解：呼吸道合胞病毒肺炎多见于2岁以内小儿，以6个月左右婴儿最为多见。起病急骤，以明显喘憋为突出表现。严重者可发生心力衰竭。肺部听诊可闻及多量哮鸣音、呼吸性喘鸣，两肺基底可闻及细湿音。X线可见双肺小点片状阴影。 3.

下列哪一项不是小儿简单性高热惊厥的特点 A.多见于6个月至3岁小儿 B.发作前均有发热、多在发

热时发作 C.发作时意识丧失 D.发作时瞳孔散大 E.发作时心率增快

热初起体温骤升时发作 C.惊厥呈全身性，持续时间不超过10分钟 D.多伴有呼吸道、消化道感染，而无中枢神经系统感染 E.发作1周后脑电图异常 本题正确答案：E 题解：高热惊厥好发年龄为6个月~3岁，上感引起者占60%；常在病初体温急剧升高时发生，体温常达39~40℃以上；全身性抽搐伴有意识障碍，但惊止后，意识很快恢复；一般只发作1次，抽搐时间短暂，数秒至数分钟，一般不超过5~10分钟；神经系统检查为阴性，脑脊液检查除压力增高，无异常发现。

4. 婴幼儿易患呼吸道感染的主要原因是 A.呼吸浅表、呼吸频率快 B.呼吸中枢发育不成熟 C.肺活量小，潮气量小 D.非特异性和特异性免疫功能均较差，呼吸道粘膜缺少SIgA E.鼻腔短小，狭窄，黏膜血管丰富 本题正确答案：D 题解：新生儿和婴幼儿血液中各种免疫球蛋白均低，婴幼儿呼吸道的非特异性和特异性免疫功能均较差，黏膜缺少SIgA，因此婴幼儿易患呼吸道感染。

5. 1岁男孩，肺炎合并心力衰竭，血钾3.4 mmol/L，血钙2mmol/L，治疗宜选 A.西地兰与钙剂 B.西地兰与钾剂 C.西地兰与钙、钾剂 D.西地兰 E.西地兰与速尿 本题正确答案：B 题解：心力衰竭的治疗，包括吸氧、镇静、强心、利尿和血管扩张剂。可选用毒毛花苷K饱和量为0.007mg/kg加于10%葡萄糖10~20ml中10分钟内缓慢滴注，或直接加入莫非管内缓慢滴注。根据病情需要6~12小时后可重复使用。也可用西地兰，饱和量为0.03~0.04 mg/kg，首次给1/2量。余量分2次，每4~6小时给药1次，加入10%葡萄糖液10~20 ml中缓慢滴注。另外，该患儿存在低血钾，应注意补钾。

6. 以下哪一项不是肺炎合并心衰的诊断要点： A.呼吸突然加快，>60次/min B.心率突然变成180次/min C.心音低钝，奔马

律 D.肝脏迅速增大 E.双肺密集中、小水泡音 本题正确答案：
：E 题解：肺炎合并心力衰竭的临床诊断指征： 突然烦躁不安，面色苍白或发灰，心率明显增快；安静时婴儿每分钟160次以上，幼儿每分钟140次以上，不能用体温增高或呼吸困难来解释。有时出现心音低钝、奔马律，颈静脉怒张或心脏扩大等。 呼吸困难，发绀加重，安静时呼吸频率婴儿达60次/分以上，而幼儿则达40次/分以上。 肝脏在短期内增大1.5cm以上，或在肋下3cm以上，伴有颜面、肢体浮肿，尿量减少等。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com