

2007年执业医师模拟试题及答案解析：儿科学3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/250/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_89\\_A7\\_c22\\_250243.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/250/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E6_89_A7_c22_250243.htm) 一、以下每一道题下面有A、B

、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。 1.

佝偻病激期，主要临床特点是 A.睡眠不安，夜惊 B.烦躁多哭，多汗 C.骨骼系统改变 D.突然抽搐，重者可突然窒息 E.动作与语言发育迟缓

本题正确答案：C 题解：激期除活动早期症状外，主要表现为骨骼变化和运动功能发育迟缓。骨骼系统

表现为：颅骨软化、方颅、肋骨串珠、肋膈沟、鸡胸、漏斗胸、佝偻病手镯或脚镯。下肢"O"形或"X"形腿等。小儿学坐后，可致脊柱后突或侧弯，重症者骨盆前后径变短，形成扁平骨盆。患儿肌肉发育不良，肌张力低下，韧带松弛，表现为头颈软弱无力，坐、立、行均较正常晚。腹肌张力低下致腹部隆起如蛙腹。表情淡漠，语言发育迟缓，但经治疗后可恢复。血清钙磷均减低，钙磷乘积常

2. 维生素D缺乏性手足搐搦症的隐性体征不包括 A.Trousseau征 B.腓反射 C.面神经征 D.巴宾斯基征 E.A B C 本题正确答案：D 题解：在维生素D缺乏性手足搐搦症不发作时，查体可见以下几种神经肌肉兴奋性增高的体征： 面神经征（Chvostek征）。

Trousseau征。 腓反射（Lustes征），称为隐性体征。 3. 口服补液不适用于： A.新生儿腹泻 B.腹泻时脱水的预防 C.腹泻伴轻度脱水 D.腹泻伴中度脱水而无明显周围循环障碍者 E.补充继续丢失量 本题正确答案：A 题解：口服补液可用于腹泻脱水的预防以及轻、中度脱水而无明显周围循环障碍的患

者。 4. 下列哪项不是维生素D缺乏性手足搐搦症的临床表现？ A.手足搐搦 B.面神经征 C.腓反射 D.巴宾斯基征 E.喉痉挛 本题正确答案：D 题解：维生素D缺乏性手足搐搦症的临床表现有手足搐搦、面神经征、腓反射、喉痉挛等。巴宾斯基征是锥体束受损的表现，不是维生素D缺乏性手足搐搦症的临床表现。

5. 下列哪项不是维生素D缺乏性手足搐搦症的临床表现？ A.手足搐搦 B.面神经征 C.腓反射 D.巴宾斯基征 E.喉痉挛 本题正确答案：D 题解：维生素D缺乏性手足搐搦症的临床表现有手足搐搦、面神经征、腓反射、喉痉挛等。巴宾斯基征是锥体束受损的表现，不是维生素D缺乏性手足搐搦症的临床表现。

6. 下列哪项不是维生素D缺乏性手足搐搦症的临床表现？ A.手足搐搦 B.面神经征 C.腓反射 D.巴宾斯基征 E.喉痉挛 本题正确答案：D 题解：维生素D缺乏性手足搐搦症的临床表现有手足搐搦、面神经征、腓反射、喉痉挛等。巴宾斯基征是锥体束受损的表现，不是维生素D缺乏性手足搐搦症的临床表现。

7. 下列哪项不是维生素D缺乏性手足搐搦症的临床表现？ A.手足搐搦 B.面神经征 C.腓反射 D.巴宾斯基征 E.喉痉挛 本题正确答案：D 题解：维生素D缺乏性手足搐搦症的临床表现有手足搐搦、面神经征、腓反射、喉痉挛等。巴宾斯基征是锥体束受损的表现，不是维生素D缺乏性手足搐搦症的临床表现。

8. 下列哪项不是维生素D缺乏性手足搐搦症的临床表现？ A.手足搐搦 B.面神经征 C.腓反射 D.巴宾斯基征 E.喉痉挛 本题正确答案：D 题解：维生素D缺乏性手足搐搦症的临床表现有手足搐搦、面神经征、腓反射、喉痉挛等。巴宾斯基征是锥体束受损的表现，不是维生素D缺乏性手足搐搦症的临床表现。

儿。有明显腹胀、休克、心肾功能不全或其他严重并发症者及新生儿不宜口服补液。如口服补液过程中呕吐频繁或腹泻、脱水加重者，应改为静4。

佝偻病性手足搐搦症的典型症状中，喉痉挛主要见于 A.婴儿 B.幼儿 C.学龄前期儿童 D.学龄期儿童 E.青春期 本题正确答案：A 题解：维生素D缺乏性手足搐搦症典型症状为1.惊厥。突然发生，最常见于婴儿期。表现四肢抽动、两眼上窜、面肌颤动，神志不清，持续数秒至数分，可数日发作1次，或1日多次至数十次发作。2.手足搐搦。突然手、足痉挛呈弓形，双手呈腕部屈曲、手指直伸、拇指内收掌心、强直痉挛。发作时意识清楚，多见于幼儿及儿童。3.喉痉挛。主要见于婴儿，因声带和喉部肌肉痉挛，引起吸气困难，喉鸣、哭闹时严重，重者可发生窒息死亡。5. 补充维生素D，预防佝偻病一般开始于 A.生后1周 B.生后2周左右 C.生后1月 D.生后6~7周 E.生后8~9周 本题正确答案：B 题解：新生儿预防佝偻病应提倡母乳喂养，尽早开始晒太阳，对早产儿、双胎及人工喂养儿或者冬季出生小儿，可于生后1~2周开始，口服维生素D500~1000IU，连续服用。不能坚持口服者可肌注维生素D10万~20万U（能维持1~2月）。6. 营养不良，常见的维生素缺乏症是 A.维生素A缺乏症 B.维生素B缺乏症 C.维生素C缺乏症 D.维生素D缺乏症 E.维生素E缺乏症 7. 营养不良患儿皮下脂肪削减的顺序是 A.躯干、臀部、四肢 腹部 面颊部 B.面颊部 腹部 躯干、臀部、四肢 C.腹部 躯干、臀部、四肢 面颊部 D.四肢 躯干 腹部 面颊 E.臀部 躯干 腹部 面颊 本题正确答案：C 题解：营养不良是因缺乏热量和（或）蛋白质所致的一种营养缺乏症。营养不良最先出现的症状是体重不增，继

之体重下降，生长发育停滞，精神萎靡，并出现各器官功能减退，易继发感染。皮下脂肪减少或消失，而表现出明显消瘦是本病的特点。皮下脂肪消减的顺序：先在腹部、背部、臀部、四肢、面颊脂肪最后消失。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)